

**ДЕРЖАВНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР
ТЕСТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ З
ВИЩОЮ ОСВІТОЮ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ «МЕДИЦИНА» І
«ФАРМАЦІЯ» ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ»**

Варіант / Variant _

**ЗБІРНИК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ
СКЛАДАННЯ ЄДКІ ЗДОБУВАЧАМИ ФАХОВОЇ
ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ**

Спеціальність «МЕДСЕСТРИНСТВО»

2022-2023 н.р. (червень)

1. Під час об'єктивного обстеження пацієнта сестра медична виявила, що на тлі сповільненого та рівномірного за глибиною дихання з'являються тривалі паузи (до 30 секунд). Який тип дихання спостерігається у пацієнта?
- A. Експіраторна задишка
 - B. Дихання Куссмауля
 - C. Інспіраторна задишка
 - D. Дихання Чейна-Стокса
 - E. **Дихання Біота***
2. Пацієнту призначено внутрішньом'язове введення 800 000 ОД антибіотика (флакон містить 1 000 000 ОД). Сестра медична розчинила його у співвідношенні 1 : 2 (1 мл розчинника на 200 000 ОД антибіотика). Який об'єм лікарського засобу треба увести пацієнту внутрішньом'язово?
- A. 3 мл
 - B. 5 мл
 - C. **4 мл***
 - D. 8 мл
 - E. 10 мл
3. Чим треба насамперед промити рану після укусу собаки до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги?
- A. -
 - B. 10% розчином натрію хлориду
 - C. **Мильним розчином***
 - D. Розчином фурациліну
 - E. Розчином бетадину
4. Який лікарський засіб використовується у разі консервативного лікування тиреотоксикозу для пригнічення секреції тиреоїдних гормонів?
- A. Преднізолон
 - B. Новокаїн
 - C. Глюкоза
 - D. Інсулін
 - E. **Мерказоліл***
5. У чоловіка виявлено відкритий перелом середньої третини лівого стегна. Із рани пульсуючим струменем витікає кров яскраво-червоного кольору. Який тимчасовий метод спинення кровотечі потрібно застосувати в цьому разі?
- A. Тиснуча пов'язка
 - B. Підвищене положення кінцівки
 - C. Туга тампонада рани
 - D. **Накладання артеріального джгута***
 - E. Максимальне згинання кінцівки в суглобі
6. Вкажіть місце накладання електроду з зеленим маркуванням під час проведення електрокардіографії.
- A. -
 - B. Ліва рука
 - C. Права рука
 - D. **Ліва нога***
 - E. Права нога

7. Пацієнту з діагнозом: гіпертонічна хвороба I ст., призначено електрофорез із 5% розчином сульфату магнію. Яка методика проведення процедури використовується у цьому разі?
- A. Електрофорез по Келату
 - B. -
 - C. Електрофорез за Вермелем
 - D. Півмаска Бергоньє
 - E. **Гальванічний комір за Щербаком***
8. Яким способом проводиться дренування плевральної порожнини для видалення повітря у разі пневмотораксу?
- A. По Суботіну
 - B. Мікроіригатором
 - C. **По Бюлау***
 - D. Трубчастим дренажем
 - E. Стрічковим дренажем
9. Яка дія електричного струму проявляється у подразненні та збудженні тканин організму людини?
- A. **Біологічна***
 - B. Термічна
 - C. Електролітична
 - D. Механічна
 - E. —
10. У породіллі після народження посліду посилилася кровотеча. Матка м'яка, погано скорочується, під час огляду плаценти виявлено дефект часточки посліду. Яка акушерська маніпуляція застосовується у цьому разі?
- A. Зовнішній масаж матки
 - B. Огляд пологових шляхів
 - C. Введення токолітичних препаратів
 - D. **Ручна ревізія порожнини матки***
 - E. Масаж матки на кулаці
11. Як називається патологічний стан, що розвивається як ускладнення бронхіальної астми та характеризується повною резистентністю до бронхолітичних засобів?
- A. Легенева кровотеча
 - B. **Астматичний статус***
 - C. Набряк легень
 - D. Анафілактичний шок
 - E. Кардіогенний шок
12. Як називається порушення діурезу, що характеризується зменшенням добової кількості сечі?
- A. Ніктурія
 - B. Дизурія
 - C. Полакіурія
 - D. Поліурія
 - E. **Олігурія***

13. Який метод дослідження сечі використовується для визначення концентраційної функції нирок?
- A. -
 - B. За Амбурже
 - C. За Аддіс-Каковським
 - D. За Нечипоренко
 - E. **За Зимницьким***
14. Сестра медична у пологовому будинку проводить підготовку новонародженої дитини з масою тіла 2300 г до щеплення проти туберкульозу. Яку вакцину вона застосує?
- A. «Пріорікс»
 - B. **БЦЖ-М***
 - C. БЦЖ
 - D. «Пентаксім»
 - E. «Інфанрікс»
15. Вкажіть біологічно активну речовину, що міститься у секреті слинних залоз п'явки.
- A. Гістамін
 - B. Гепарин
 - C. **Гірудин ***
 - D. Лізоцим
 - E. Фібринолізин
16. У пацієнтки з ожирінням під час обстеження в ділянці живота та стегон виявлено надлишкове, рівномірне розподілення жирової тканини. Який це вид ожиріння?
- A. **Аліментарно-конституційне***
 - B. Гіпотиреоїдне
 - C. -
 - D. Диспластичне
 - E. Церебральне
17. У пацієнта з діагнозом: пневмонія, підвищилася температура тіла до 39,0°C, шкіра червона, гаряча на дотик, волога. Яку тактику треба застосувати сестрі медичній для зниження температури пацієнту?
- A. Поставити гірчичники
 - B. Обкласти грілками
 - C. Поставити банки
 - D. **Фізичні методи охолодження ***
 - E. Накласти зігрівальний компрес
18. Чоловік скаржиться на періодичні закрепи, випорожнення з домішками крові та переймоподібний біль у животі. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, живіт приймає участь в акті дихання, м'який. У лівому підребер'ї пальпується щільне болюче утворення. Який інструментальний діагностичний метод використовується для обстеження всіх відділів товстого кишечника та взяття біопсії?
- A. Комп'ютерна томографія
 - B. УЗД
 - C. Іригоскопія
 - D. **Колоноскопія***
 - E. Оглядовий рентген-знімок черевної порожнини

19. Які продукти треба обмежити в харчовому раціоні пацієнта, у якого виявлено здуття живота та метеоризм?
- A. Каву, міцний чай
 - B. Яблука, гарбуз
 - C. **Капусту, бобові***
 - D. М'ясо, печінку
 - E. Яйця, гречану крупу
20. На яку глибину вводиться газовідвідна трубка в пряму кишку дорослим пацієнтам для усунення метеоризму?
- A. 3-4 см
 - B. 5-10 см
 - C. 10-15 см
 - D. 15-20 см
 - E. **20-30 см***
21. Який метод контролю якості дезінфекції передбачає посів матеріалу на поживне середовище для виявлення мікрофлори?
- A. Фізичний
 - B. **Бактеріологічний***
 - C. Хімічний
 - D. Інструментальний
 - E. Візуальний
22. Який спеціальний інструмент треба підготувати сестрі медичній для аспіраційної біопсії слизової оболонки матки?
- A. Конхотом
 - B. Пінцет
 - C. Корцанг
 - D. Скальпель
 - E. **Пайпель***
23. Чоловік віком 79 років, який хворіє на гіпертонічну хворобу, скаржиться на озноб, пітливість, слабкість, задишку та появу нестерпного болю в ділянці серця, що поширюється на ліву руку та не проходить після приймання нітрогліцерину. Для якого патологічного стану характерні ці симптоми?
- A. Серцевої астми
 - B. Артеріальної гіпертензії
 - C. Пневмонії
 - D. **Інфаркту міокарда ***
 - E. Стенокардії
24. Для якого захворювання характерним є зниження секреторної та кислотоутворювальної функцій шлунку?
- A. Виразкової хвороби шлунку
 - B. Цирозу печінки
 - C. **Хронічного атрофічного гастриту ***
 - D. Хронічного панкреатиту
 - E. Хронічного гіпертрофічного гастриту

25. У тримісячної дитини спостерігається неспокій, плаксивість, порушення сну, підвищена пітливість, облісіння потилиці, здуття живота. Для якого захворювання характерні ці клінічні прояви?
- A. Спазмофілії
 - B. Гіпервітамінозу D
 - C. Рахіту***
 - D. Гіпотрофії
 - E. Алергічного діатезу
26. Який симптом є часто позитивним у разі захворювань нирок?
- A. Кера
 - B. Бабінського
 - C. Ортнера
 - D. Пастернацького ***
 - E. Щоткіна-Блюмберга
27. Чоловік скаржиться на раптову появу висипу на шкірі та свербіж після вживання полуниці. Під час огляду на шкірі тулуба та кінцівок виявлено червоні плями, пухирі різних розмірів, подряпини, АТ — 120/80 мм рт.ст, пульс — 82 уд/хв. Яке захворювання розвинулося у чоловіка?
- A. Анафілактичний шок
 - B. Кропив'янка***
 - C. Короста
 - D. набряк Квінке
 - E. Геморагічний васкуліт
28. У чоловіка віком 54 роки спостерігається головний біль, шум у вухах, запаморочення та стійке підвищення артеріального тиску (АТ — 160/100 мм рт. ст). Який патологічний стан розвинувся у пацієнта?
- A. Інфаркт міокарда
 - B. Стенокардія
 - C. Серцева астма
 - D. Ішемічний інсульт
 - E. Артеріальна гіпертензія***
29. Чоловік віком 50 років скаржиться на загальну слабкість, свербіння шкіри, тупий ниючий біль у правому підребер'ї, здуття живота, закрепи, що чергуються з діареєю. Об'єктивно спостерігається: збільшення печінки, судинні зірочки на шкірі, розширення венозної сітки навколо пупка, асцит, гінекомастія. Для якого захворювання характерні ці симптоми?
- A. Хронічного гепатиту
 - B. Вірусного гепатиту
 - C. Цирозу печінки***
 - B. Хронічного холециститу
 - E. Жовчнокам'яної хвороби
30. До якого обстеження сестрі медичній треба підготувати пацієнта, у якого є припущення на ішемічний інсульт?
- A. Електроміографії
 - B. Рентгенографії кісток черепа
 - C. Ехокардіографії
 - D. Електрокардіографії

Е. Магнітно-резонансної томографії *

31. Яка контрастна речовина використовується для ректального введення під час рентгенологічного обстеження товстої кишки?

- А. Уротраст
- В. Холевід
- С. Верографін
- Д. Біліграфін
- Е. Барію сульфат***

32. У чоловіка віком 58 років, який хворіє на цироз печінки, раптово з'явилися такі симптоми: збудження змінилося на сонливість, нудота, блювання, посмикування м'язів обличчя та кінцівок, з рота відчувається запах аміаку, температура тіла 39-40°C, спостерігається дихання Чейна-Стокса. Яке ускладнення розвинулося у пацієнта?

- А. Печінкова кома***
- В. Бактеріальний перитоніт
- С. Перфорація
- Д. Пенетрація
- Е. Шлункова кровотеча

33. Чоловік скаржиться на сильний біль у поперековій ділянці та часті позиви до сечовипускання, нудоту. Пацієнт збуджений, метушливий. Під час огляду шкірні покриви бліді, симптом Пастернацького позитивний з правого боку. Яку тактику треба застосувати насамперед для полегшення стану пацієнта?

- А. Уведення знеболювальних засобів
- В. Уведення сечогінних препаратів
- С. Уведення спазмолітичних препаратів
- Д. Холод на поперекову ділянку
- Е. Тепло на поперекову ділянку***

34. У чоловіка розвинувся напад задишки з різко утрудненим видихом, відчуття стиснення за грудиною, сухий кашель. Об'єктивно спостерігається: положення ортопное, акроціаноз, на відстані чути свистячі хрипи. Який патологічний стан розвинувся у пацієнта?

- А. Напад ларингостенозу
- В. Напад бронхіальної астми***
- С. Напад ниркової кольки
- Д. набряк Квінке
- Е. Напад серцевої астми

35. У дівчини за декілька місяців після початку статевого життя у ділянці великих статевих губ з'явилися сосочкоподібні розростання. Який збудник, найімовірніше, спричинив цю патологію?

- А. Папіломавірус***
- В. Трихомонада
- С. Хламідія
- Д. Протей
- Е. Гарднерела

36. У жінки в терміні вагітності 35 тижнів з'явилися різкий біль у животі та незначні кров'яністі виділення зі статевих шляхів. Об'єктивно спостерігається: блідість шкіри, пульс — 100/хв, АТ— 100/60 мм рт. ст. Матка напружена, болюча. Положення плода поздовжнє, голівка передлежить над площиною входу в малий таз, серцебиття 160/хв, ритмічне. Який патологічний стан розвинувся у жінки?
- A. Загроза розриву матки
 - B. Аборт у ході
 - C. Розрив матки, що відбувся
 - D. Передчасне відшарування нормальне розташованої плаценти***
 - E. Неповне передлежання плаценти
37. У якій лабораторії проводиться дослідження носоглоткових змивів на грип та ГРВІ?
- A. Вірусологічний***
 - B. Імунологічний
 - C. Бактеріологічний
 - D. Клінічний
 - E. Біохімічний
38. Який вигляд мокротиння характерний для раку легень?
- A. «Іржаве»
 - B. «Перлинне»
 - C. «Малинового желе» ***
 - D. Склоподібне
 - E. Пінисте рожеве
39. У чоловіка віком 65 років, який хворіє на гіпертонічну хворобу, раптово розвинувся напад задишки та кашель із виділенням пінистого рожевого мокротиння. Для якого ускладнення характерні ці симптоми?
- A. Туберкульозу
 - B. Серцевої астми
 - C. Бронхіальної астми
 - D. Набряку легень***
 - E. Інфаркту міокарда
40. Вкажіть шлях введення контрастної речовини в кровоносне русло під час проведення холецистографії?
- A. Підшкірно
 - B. Внутрішньовенно***
 - C. Внутрішньошкірно
 - D. Внутрішньом'язово
 - E. Сублінгвально
41. Яка анатомічна ділянка тіла людини використовується для проведення щеплення БЦЖ?
- A. Верхній зовнішній квадрант сідниці
 - B. Підлопаткова ділянка
 - C. Передня поверхня стегна
 - D. Середня третина внутрішньої поверхні передпліччя
 - E. Зовнішня поверхня верхньої третини лівого плеча***

42. Чоловік віком 58 років із тривалим рецидивним перебігом виразкової хвороби шлунку скаржиться на біль в епігастрії постійного характеру, що іррадіює в спину, значне схуднення, відразу до м'ясної їжі. Яке ускладнення, найімовірніше, розвинулося у пацієнта?
- A. Пенетрація
 - B. Малігнізація***
 - C. Пілоростеноз
 - D. Перфорація
 - E. Шлункова кровотеча
43. У пацієнта попередній діагноз: загострення хронічного панкреатиту. Яке дослідження проводиться для уточнення діагнозу?
- A. Аналіз калу на приховану кров
 - B. Аналіз крові на креатинін
 - C. Аналіз крові на білірубін
 - D. Аналіз сечі на глюкозу
 - E. Аналіз сечі на α -амілазу***
44. Який суб'єктивний симптом найхарактерніший для нападу бронхіальної астми?
- A. Шум тертя плеври
 - B. Експіраторна задишка***
 - C. Крепітація
 - D. Біль у грудній клітці
 - E. Інспіраторна задишка
45. Яке специфічне місцеве ускладнення інсулінотерапії виникає у разі введення інсуліну в одне й теж місце?
- A. Ліподистрофія***
 - B. Інфільтрат
 - C. Абсцес
 - D. Гематома
 - E. Некроз
46. Під час обстеження роділлі виявлено, що спинка плода обернена до правої стінки матки, над входом у малий таз розташована м'яка частина плода, яка не балотує і не має чітких контурів. Яке розташування плода у порожнині матки?
- A. Задній вид, головне передлежання
 - B. Друга позиція, тазове передлежання***
 - C. Перша позиція, тазове передлежання
 - D. Друга позиція, головне передлежання
 - E. Задній вид, тазове передлежання
47. Пацієнт, який збирає сечу для дослідження за методом Зимницького, повідомив сестру медичну про те, що не може зібрати сечу в третій контейнер, у зв'язку з відсутністю позиву до сечовипускання. Яка тактика сестри медичної у цьому разі?
- A. Виконати катетеризацію сечового міхура
 - B. Увести пацієнту сечогінний препарат
 - C. Дати пацієнту випити води
 - D. Застосувати методи рефлекторного виклику акту сечовипускання
 - E. Третій контейнер залишити порожнім***

48. У пацієнта з діагнозом: хронічна ниркова недостатність, розвинулася уремія. Який симптом характерний для цього патологічного стану?
- A. Збільшення лімфатичних вузлів
 - B. Аміачний запах з рота***
 - C. Підвищення температури тіла
 - D. Підвищення апетиту
 - E. Гіперемія шкірних покривів
49. Як називається розмір площини входу в малий таз, що проходить між крижовим мисом та серединою верхньої - внутрішнього краю лобкового симфізу?
- A. -
 - B. Косий
 - C. Прямий ***
 - D. Інтерспінальний
 - E. Поперечний
50. Чоловік віком 45 років скаржиться на різкий біль у потиличній ділянці голови, запаморочення, шум у вухах. Об'єктивно спостерігається: пацієнт збуджений, обличчя гіперемоване, пульс — 92/хв, напружений, ритмічний, АТ — 190/100 мм рт. ст., тони серця ослаблені, акцент другого тону над аортою. Який препарат використовується для надання невідкладної допомоги у цьому разі?
- A. Магнію сульфат ***
 - B. Анальгін
 - C. Кордіамін
 - D. Димедрол
 - E. Адреналін
51. У юнака віком 20 років після укусу бджоли з'явилися: щільний набряк повік і губ, захриплість голосу, «гавкаючий» кашель, відчуття нестачі повітря. Об'єктивно спостерігається: пацієнт збуджений, дихання утруднене, обличчя бліде та набрякле, ціаноз губ. Пульс — 86/хв, ритмічний, АТ — 120/80 мм рт. ст. Який патологічний стан розвинувся у пацієнта?
- A. Кропив'янка
 - B. Анафілактичний шок
 - C. Астматичний стан
 - D. Синдром Лайєлла
 - E. Набряк Квінке***
52. У чоловіка віком 28 років у ділянці верхньої губи спостерігаються гіперемія шкіри та поява дрібних пухирців із гнійним умістом, покритих жовтими кірками, піднижньощелепний лімфаденіт. Для якої патології характерні ці симптоми?
- A. Мікроспорії
 - B. Кандидозу
 - C. Фурункулу
 - D. Сикозу***
 - E. Імпетиго
53. У чоловіка після значного фізичного навантаження раптово виник гострий біль у поперековій ділянці, що іррадіює вниз живота, часте болісне сечовипускання, виділення кров'янистої сечі. Пацієнт збуджений, спостерігається блювання. Який патологічний стан розвинувся у пацієнта?
- A. -

- В. Напад ниркової кольки***
- С. Напад жовчної кольки
- Д. Харчове отруєння
- Е. Гостра затримка сечі

54. Яка кровотеча супроводжується виділенням яскраво-червоної пінистої крові під час кашлю?

- А. Легенева ***
- В. Шлункова
- С. Кишкова
- Д. -
- Е. Носова

55. У чотирирічної дитини спостерігаються напади спазматичного кашлю з репризами. Який матеріал треба взяти для проведення лабораторного дослідження у цьому разі?

- А. Змиви із носоглотки
- В. Слиз методом «кашльових пластинок» ***
- С. Промивні води шлунку
- Д. Промивні води бронхів
- Е. Мокротиння

56. Яка з наведених нижче груп лікарських засобів використовується для лікування алергічних захворювань?

- А. Антидепресанти
- В. Антациди
- С. Антиагреганти
- Д. Антагоністи кальцію
- Е. Антигістамінні***

57. Жінка після ДТП скаржиться на білі і відсутність рухів у ділянці лівої ключиці. Під час огляду виявлено вкороченні лівого надпліччя, його деформацію та набряк, згладження надключичної ямки. Для якого ушкодження характерні ці симптоми?

- А. Відкритого перелому ключиці
- В. Вивиху ключиці
- С. Перелом ключиці зі зміщенням кісткових уламків
- Д. Перелому ключиці без зміщення кісткових уламків ***
- Е. Забою у ділянці ключиці

58. Вкажіть прояви дизуричного синдрому.

- А. Позитивний симптом Пастернацького
- В. Альбумінурія, кетонурія
- С. Піурія, протеїнурія
- Д. Часте болісне сечовипускання ***
- Е. Гіпертензія, набряки

59. Для профілактики якого специфічного ускладнення черевного тифу на 3-му тижні хвороби пацієнту треба дотримуватися ліжкового режиму?

- А. Кишкової кровотечі***
- В. Розриву селезінки
- С. Рецидиву захворювання
- Д. Генералізації інфекції
- Е. Печінкової недостатності

60. Вкажіть тривалість прийому родонової ванни.
- A. 5-7 хв
 - B. 50-60 хв
 - C. 30-40 хв
 - D. 1-2 хв
 - E. **10-15 хв ***
61. Яке ускладнення розвивається як наслідок ревматоїдного артриту?
- A. Адинамія
 - B. Невралгія
 - C. Гарячка
 - D. Астенія
 - E. **Анкілоз***
62. Як називається метод ендоскопічного дослідження внутрішньої поверхні сечового міхура?
- A. Ректороманоскопія
 - B. Бронхоскопія
 - C. Колоноскопія
 - D. **Цистоскопія***
 - E. Езофагогастродуоденоскопія
63. Яке положення тіла потрібно надати шестирічній дитині, у якої після введення антибіотика розвинувся анафілактичний шок?
- A. Напівсидяче
 - B. **На спині, з повернутою на бік головою***
 - C. На спині, з припіднятими ногами
 - D. На лівому боці
 - E. На животі
64. Після роботи з електроприладами чоловік помітив на долоні правої руки біло-сіру пляму діаметром 4 мм. Який вид електротравми виник у чоловіка?
- A. -
 - B. Електроофтальмія
 - C. **Знак***
 - D. Металізація
 - E. Опік
65. Який препарат із групи нейролептиків використовується у пацієнтів з діагнозом: шизофренія, для усунення психомоторного збудження, що супроводжується галюцинаціями та маячними ідеями?
- A. Натрію оксибутират
 - B. Димедрол
 - C. Пірацетам
 - D. **Аміназин ***
 - E. Налоксон
66. Пацієнту неврологічного відділення з припущенням на субарахноїдальний крововилив проведено спинномозкову пункцію. Який колір ліквору характерний для цього захворювання?
- A. Жовтувато-зеленуватий
 - B. Безбарвний

- C. Каламутний
- D. Прозорий
- E. **Червоний***

67. Для якого захворювання характерні такі зміни в загальному аналізі сечі: сеча каламутна, з осадом і пластівцями, лейкоцитурія, бактеріурія, протеїнурія (менше 1 г/л)?

- A. Ниркової недостатності
- B. Хронічного гломерулонефриту
- C. **Гострого пієлонефриту***
- D. Гострого гломерулонефриту
- E. Сечокам'яної хвороби

68. Пацієнт скаржиться на озноб, гарячку, профузне потовиділення, що повторюються кожні три дні. З анамнезу відомо, що тиждень тому повернувся з Африки. Об'єктивно спостерігається: температура тіла 40°C, шкіра обличчя гіперемована, у легенях жорстке дихання, живіт пальпаторно безболісний, печінка та селезінка збільшені. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- A. Лептоспірозу
- B. Грипу
- C. Висипного тифу
- D. **Малярії***
- E. Вірусного гепатиту

69. Чоловік віком 50 років скаржиться на різкий, інтенсивний, стискаючий біль за грудиною з іррадіацією в ліву руку, ліве плече та ліву лопатку. Біль триває упродовж двох годин, не знімається нітрогліцерином. Об'єктивно спостерігається: пацієнт збуджений, відчуває страх смерті, шкіра та видимі слизові оболонки бліді, ціаноз губ, пульс — 84/хв, ритмічний, АТ — 130/80 мм рт. ст., тони серця ослаблені. На ЕКГ спостерігається патологічний зубець Q у відведеннях I, aVL і VI- V2. Яке захворювання розвинулося у пацієнта?

- A. Q-інфаркт міокарда, астматична форма
- B. -
- C. Q-інфаркт міокарда, гастралгічна форма
- D. **Q-інфаркт міокарда, ангінозна форма***
- E. Q-інфаркт міокарда, аритмічна форма

70. До якої функціональної проби треба підготувати пацієнта зі стабільною стенокардією напруження під час виконання плану медсестринських втручань?

- A. Кліноортостатичної проби
- B. Проби із затримкою дихання
- C. **Велоергометрії***
- D. Атропінової проба
- E. Синокаротидної проби

71. Які лікарські засоби застосовуються впродовж усього життя як замісна терапія пацієнтам після струмектомії або тиреоїдектомії?

- A. Наркотичні анальгетики
- B. **Тиреоїдні гормони***
- C. Антибіотики
- D. Антидепресанти
- E. Транквілізатори

72. Споживання продуктів зі збагачених вмістом якого мікроелементу треба порекомендувати пацієнту, який хворіє на хронічну серцеву недостатність?

- A. **Калію ***
- B. Кальцію
- C. Магнію
- D. Заліза
- E. Натрію

73. У жінки на 31 тижні вагітності розпочалися пологи та з'явилася кровотеча з піхви. Під час вагінального дослідження виявлено: шийка матки розкрита на 8 см, внутрішнє вічко на 1/3 перекрите м'якою, губчастою тканиною, поруч пальпується навколоплідний міхур. У роділлі спостерігається активна пологова діяльність. Вкажіть вид передлежання плаценти.

- A. **Бокове***
- B. Низьке
- C. Оболонкове
- D. Центральне
- E. Крайове

74. У пацієнта, який хворіє на виразкову хворобу шлунку, раптово виникла шлунково-кишкова кровотеча. Які гемодинамічні зміни спостерігаються у разі цього невідкладного стану?

- A. Тахікардія, підвищення АТ
- B. Аритмія, АТ не змінюється
- C. Брадикардія, підвищення АТ
- D. **Тахікардія, зниження АТ***
- E. Брадикардія, зниження АТ

75. Чоловік упродовж 10-ти років хворіє на дерматологічне захворювання, що загострюється в осінньо-зимовий період. Під час огляду виявлено: на шкірі волосистої частини голови, розгинальних поверхнях кінцівок спостерігаються рожево-червоні плями та бляшки, покриті сухими сріблястими лусочками, незначний свербіж. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- A. Сухої себореї
- B. Нейродерміту
- C. Червоного плоского лишая
- D. **Псоріазу***
- E. Системного червоного вовчака

76. Чоловік скаржиться на підвищення температури тіла, головний біль та різкий розпираючий біль у ділянці задньої поверхні шиї. Під час огляду виявлено щільний інфільтрат темно-червоного кольору, діаметром 7-8 см, різко болючий під час пальпації, покритий дрібними множинними отворами, з яких виділяється гнійна рідина. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- A. Бешихи
- B. Фурункулу
- C. **Карбункулу***
- D. Дерматофітії
- E. Контагіозного моллюска

77. Семирічна дитина скаржиться на біль в епігастрії, періодичні нудоту, відрижку повітрям, печію, відчуття важкості у шлунку. Які особливості підготовки дитини до дослідження на *Helicobacter Pylori*?
- A. Уникати чищення зубів і полоскання рота зранку перед дослідженням
 - B. Застосувати очисну клізму напередодні
 - C. Перед обстеженням збільшити вживання рідини
 - D. Припинити приймання антибіотиків за 4-6 тижнів до дослідження***
 - E. Приймати проносні засоби упродовж 3-х днів до дослідження
78. Який метод дослідження використовується для діагностики лейкозів?
- A. Імунологічний аналіз крові
 - B. Стернальна пункція***
 - C. Коагулограма
 - D. Загальний аналіз сечі
 - E. Біохімічний аналіз крові
79. Породілля в ранньому післяпологовому періоді перебуває в пологовій залі. Як часто треба виконувати зовнішній масаж матки для профілактики кровотечі?
- A. Кожні 5 хвилин
 - B. Кожні 60 хвилин
 - C. Кожні 30 хвилин
 - D. Кожні 10 хвилин
 - E. Кожні 15 хвилин***
80. До пологового відділення шпиталізовано жінку у терміні вагітності 26- 27 тижнів, яка скаржиться на появу незначних кров'янистих виділень з піхви вночі, в стані спокою. На момент огляду кровотеча припинилася, загальний стан задовільний. Який метод діагностики треба провести для уточнення діагнозу в цьому разі?
- A. Кольпоскопію
 - B. Трансвагінальне УЗД***
 - C. Амніоскопію
 - D. Внутрішнє акушерське обстеження
 - E. Зовнішнє акушерське обстеження
81. У пологовому будинку новонародженій дитині на 3-й день життя заплановано проведення щеплення проти туберкульозу вакциною БЦЖ. Який спосіб введення цієї вакцини?
- A. Внутрішньом'язово
 - B. Внутрішньошкірно ***
 - C. Підшкірно
 - D. Перорально
 - E. Внутрішньовенно
82. Як називається патологічний стан, що характеризується болем у суглобі та не супроводжується запальним процесом та/або порушенням рухливості у ньому?
- A. Артрит
 - B. Поліартрит
 - C. Артроз
 - D. Полікістоз
 - E. Арталгія***

83. У пацієнта інфекційного стаціонару спостерігається тяжкий загальний стан, акроціаноз, сухість шкіри, загострення рис обличчя, блювання «фонтаном», діарея більше 15 разів на добу, періодичні судоми. Випорожнення водянисті, каламутні, з білими пластівцями. Який механізм розвитку діареї у пацієнта?
- A. Осмотичний
 - B. Запальний
 - C. Інвазивний
 - D. Ексудативний
 - E. **Секреторний***
84. Під час догляду за пацієнтом із хронічною серцевою недостатністю сестра медична звернула увагу на збільшення маси тіла пацієнта та зменшення виділення кількості сечі. Аналіз водного балансу встановив, що добовий діурез пацієнта становить 50% від кількості прийнятої рідини. Зробіть висновок за результатами обстеження.
- A. Порушення метаболізму
 - B. Ожиріння
 - C. **Поява прихованих набряків ***
 - D. Зневоднення
 - E. -
85. У жінки в терміні вагітності 33 тижні спостерігається збільшення маси тіла — 500 г за тиждень та підвищення АТ — 150/90 мм рт. ст. Яке додаткове лабораторне дослідження треба провести жінці насамперед?
- A. **Визначення білка в сечі***
 - B. Бактеріологічне дослідження сечі
 - C. Загальний аналіз крові
 - D. Біохімічний аналіз крові
 - E. Коагулограма
86. Чоловіку віком 37 років для лікування пептичної виразки дванадцятипалої кишки призначено фамотидин. Яка основна фармакологічна дія цього лікарського засобу?
- A. Спазмолітична
 - B. Антигістамінна
 - C. Бактеріостатична
 - D. **Антисекреторна ***
 - E. Бактерицидна
87. Чоловік віком 45 років після емоційного перенапруження раптом відчув різкий головний біль, спостерігається блювання. Вогнищева неврологічна симптоматика відсутня. Визначається ригідність потиличних м'язів. Артеріальний тиск — 200/110 рт.ст. Отриманий у результаті люмбальної пункції ліквор забарвлений кров'ю. Для якого захворювання це характерно?
- A. Геморагічного інсульту
 - B. Ішемічного інсульту
 - C. **Субарахноїдального крововиливу***
 - D. Дисциркуляторної енцефалопатії
 - E. Транзиторного порушення мозкового кровообігу
88. За який термін часу треба зібрати сечу на дослідження для визначення вмісту глюкози?
- A. За 10 год
 - B. **За добу***

- C. -
- D. а 8 год
- E. За 1 год

89. Який тип мінеральної води треба порекомендувати вживати пацієнту, у якого під час обстеження виявлено наявність сечокислих каменів у нирках?

- A. Гідрокарбонатну (лужну)***
- B. Хлоридну
- C. Сульфатну
- D. Сірководневу
- E. Вуглекислу

90. Які клінічні прояви найхарактерніші для гострого гломерулонефриту?

- A. Гіпертермія, гіпотензія
- B. Гіпертензія, набряки***
- C. Гіпотензія, біль у поперековій ділянці
- D. Анурія, свербіж шкіри
- E. Гарячка, часте і болісне сечовипускання

91. Пацієнтка віком 32 роки скаржиться на загальну слабкість, підвищення температури тіла, пітливість, задишку та кашель із виділенням гнійного з неприємним запахом мокротиння у великій кількості (до 1 л на добу). Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- A. Гострого бронхіту
- B. Вогнищевої пневмонії
- C. Раку легень
- D. Абсцесу легень ***
- E. Пневмосклерозу

92. У жінки на другий день після діагностичного вишкрібання порожнини матки підвищилася температура тіла до 38°C, з'явилися біль у низу живота та слизово-гнійні виділення з піхви. Під час вагінального дослідження виявлено: матка збільшена, болюча, м'яка. Яка з наведених нижче груп лікарських засобів використовується для лікування цього ускладнення?

- A. Антибактеріальні***
- B. Глюкокортикоїди
- C. Цитостатики
- D. Гсмостатики
- E. Седативні

93. Чоловік, який хворіє на гіпертонічну хворобу, після емоційного перенавантаження раптово втратив свідомість. Об'єктивно спостерігається: зіниці на світло не реагують, гіперемія обличчя, пульс — 110/хв, напружений, АТ — 200/110 мм рт. ст., лівий кут рота опущений, лівостороння геміплегія. Яке положення тіла треба надати пацієнту під час надання допомоги?

- A. На правому боці, з відхиленою назад головою
- B. На спині, з піднятим ножним кінцем ліжка
- C. На лівому боці, з відхиленою назад головою
- D. На спині, з піднятим головним кінцем ліжка***
- E. На животі, з повернутою на бік головою

94. Яка група лікарських засобів застосовується для лікування рухових порушень після травми мозку?
- A. **Антихолінестеразні***
 - B. Кортикостероїди
 - C. Антikonвульсанти
 - D. Міорелаксанти
 - E. Ноотропи
95. Пацієнт скаржиться на тупий біль у правому підребер'ї, слабкість, зниження апетиту, біль у суглобах упродовж двох тижнів. З анамнезу відомо, що чоловік вживає ін'єкційні наркотики. Під час об'єктивного обстеження виявлено: жовтяниця шкіри і склер, збільшення печінки та селезінки, сеча темного кольору, випорожнення знебарвлені. Для якого захворювання характерні ці клінічні показники?
- A. Висипного тифу
 - B. Кишкового ієрсиніозу
 - C. **Вірусного гепатиту С ***
 - D. ВІЛ-інфекції
 - E. Лептоспірозу
96. У пацієнта з інсультом спостерігається часткове обмеження довільних рухів у правих кінцівках із підвищенням м'язового тону та фізіологічних рефлексів. Який це вид рухового порушення?
- A. Центральна геміплегія
 - B. Периферична геміплегія
 - C. Центральний парепарез
 - D. Периферичний геміпарез
 - E. **Центральний геміпарез***
97. Які клінічні прояви найхарактерніші для гострого пієлонефриту?
- A. **Гарячка, біль у поперековій ділянці***
 - B. Тахікардія, сеча кольору «м'ясних помий»
 - C. Гіпертензія, набряки
 - D. Анурія, свербіж шкіри
 - E. —
98. Як називається виробничий фактор, вплив якого призводить до погіршення стану здоров'я і зниження працездатності працівника?
- A. -
 - B. Допустимий
 - C. **Шкідливий ***
 - D. Оптимальний
 - E. Небезпечний
99. Який із наведених нижче методів дослідження найінформативніший для діагностики туберкульозу легень?
- A. Загальний аналіз крові
 - B. Стернальна пункція
 - C. Спірометрія
 - D. **Рентгенографія органів грудної клітки***
 - E. Біохімічний аналіз крові

100. Вкажіть віддалене ускладнення генітального туберкульозу у жінок.
- A. Підвищена пітливість
 - B. Порушення менструального циклу
 - C. Субфебрилітет
 - D. Швидка втомлюваність
 - E. **Безпліддя***
101. Під час оцінювання стану новонародженої дитини на 1-й хвилині життя виявлено: ЧСС — 120/хв, дихання регулярне, крик голосний, шкіра рожева, рухи активні, реакція на подразники жвава. Оцініть стан новонародженого за шкалою Апгар.
- A. 5 балів
 - B. 4 бали
 - C. 2 бали
 - D. 7 балів
 - E. **10 балів***
102. Жінці віком 35 років діагностовано залізодефіцитну анемію. Які продукти харчування мають бути у достатній кількості в раціоні харчування жінки?
- A. Молочні продукти
 - B. Борошняні вироби
 - C. **М'ясні продукти***
 - B. Овочі і фрукти
 - E. Морська капуста
103. Пацієнту призначено внутрішньом'язове введення 60 мг 4% розчину гентаміцину сульфату. В ампулах по 2 мл міститься 80 мг цього антибіотика. Скільки мілілітрів препарату треба набрати в шприц для виконання ін'єкції?
- A. **1,5 мл***
 - B. 2 мл
 - C. 1 мл
 - D. 0,5 мл
 - E. 3 мл
104. Який збудник найчастіше спричиняє розвиток післяпологового маститу?
- A. Анаеробні коки
 - B. Епідермальний стафілокок
 - C. **Золотистий стафілокок ***
 - D. Протей
 - E. Стрептокок
105. Під час парентерального введення камфорової олії сестра медична після введення шприца відтягнула його поршень на себе. Профілактику якого ускладнення вона виконала?
- A. Некрозу
 - B. Повітряної емболії
 - C. Гематоми
 - D. **Медикаментозної емболії ***
 - E. Інфільтрату
106. Який лікарський препарат використовується насамперед під час надання невідкладної медичної допомоги пацієнту з анафілактичним шоком?
- A. Еритроміцин

- В. Ампіцилін
- С. Епінефрин***
- Д. Атропін
- Е. Диклофенак

107. Пацієнт ендокринологічного відділення скаржиться на прискорене серцебиття, біль у ділянці серця, погіршення сну, схуднення на тлі підвищення апетиту. Об'єктивно спостерігається: пацієнт збуджений, тремор пальців рук, шкіра волога, тепла, температура тіла — 37,2°C, пульс — 100/хв, АТ — 150/90 мм рт. ст., екзофтальм, позитивний симптом Грефе, збільшення щитоподібної залози, тони серця звучні, систолічний шум на верхівці. Яке дослідження треба провести для визначення функції щитоподібної залози?

- А. УЗД щитоподібної залози
- В. Аналіз крові на тиреоїдні гормони***
- С. МРТ головного мозку
- Д. Загальний аналіз крові
- Е. Аналіз крові на глюкозу

108. Під яким кутом вводиться голка у верхньо-зовнішній квадрант сідниці під час виконання внутрішньом'язової ін'єкції?

- А. 30°
- В. 70°
- С. 45°
- Д. 15°
- Е. 90° ***

109. Вкажіть типовий симптом, характерний для хронічної серцевої недостатності.

- А. Набряки на обличчі
- В. Підвищення температури тіла
- С. Пітливість
- Д. Крововиливи на шкірі
- Е. Набряки на нижніх кінцівках***

110. Працівники, які обслуговують каналізаційну мережу, відчули в повітрі специфічний запах «тухлих яєць». За одну годину після цього в них з'явилися слезотеча, різі в очах, кашель, нежить, задишка, біль у грудях, головний біль, запаморочення, нудота. Для отруєння якою хімічною речовиною характерні ці симптоми?

- А. Аміаком
- В. Фосгеном
- С. Сірководнем***
- Д. Вуглецю оксидом
- Е. Хлором

111. Пацієнт скаржиться на надсадний кашель, прогресуючу задишку, біль у грудній клітці, кровохаркання. Попередній діагноз — рак легень. До якого обстеження треба підготувати пацієнта для уточнення діагнозу?

- А. ФГДС із біопсією
- В. Електрокардіографії
- С. Іригоскопії
- Д. Колоноскопії
- Е. Бронхоскопії з біопсією***

112. Пацієнт скаржиться на біль унизу живота та часті рідкі випорожнення (спочатку калового характеру, а потім мізерні, з домішками слизу та крові по типу «ректального плевка»). Під час пальпації живота спостерігається біль та виражений спазм у ділянці сигмоподібної кишки. З боку інших органів патології не виявлено. Який лабораторний метод діагностики треба застосувати для підтвердження діагнозу?
- А. Біохімічний аналіз крові
 - В. Бактеріологічний***
 - С. Загальний аналіз крові
 - Д. Аналіз крові на глюкозу
 - Е. Копрологічний
113. Який розчин використовується для промивання постійного катетера Фолея?
- А. 0,02% р-н фурациліну***
 - В. 3% р-н хлораміну
 - С. 5% р-н глюкози
 - Д. 2% р-н натрію гідрокарбонату
 - Е. 6% р-н перекису водню
114. Ускладненням якого захворювання є кретинізм?
- А. Вродженого гіпотиреозу***
 - В. Нецукрового діабету
 - С. Хвороби Іценко-Кушинга
 - Д. Хвороби Аддісона
 - Е. Цукрового діабету
115. До якої фармакологічної групи лікарських засобів відноситься діазепам?
- А. Антikonвульсанти
 - В. Транквілізатори***
 - С. Міорелаксанти
 - Д. Ноотропи
 - Е. Антидепресанти
116. Який вид анестезії використовується під час оперативного лікування підшкірного панарицію?
- А. За Вишневським
 - В. За Оберстом-Лукашевичем***
 - С. Інфільтраційна
 - Д. Внутрішньокісткова
 - Е. Термінальна
117. Які параметри враховуються під час оцінювання ефективності пологової діяльності?
- А. Серцебиття плода
 - В. Частота та ритмічність пульсу
 - С. Температура тіла
 - Д. Артеріальний тиск
 - Е. Частота, тривалість та інтенсивніс перейм***
118. Як називається метод неінвазивного дослідження функції зовнішнього дихання, що проводиться для оцінки стану легень та бронхів, діагностики захворювань дихальної системи та контролю їх лікування?
- А. Шкірні алергологічні тести
 - В. Оглядова рентгенографія органів грудної клітки

- C. **Спірографія ***
- D. УЗД легень
- E. Бронхоскопія

119. Вкажіть особливість підготовки пацієнта до проведення езофагогастро-дуоденоскопії.

- A. За 1 годину до обстеження треба випити барій
- B. Напередодні застосувати харчову клізму
- C. Призначити розвантажувальну дієту
- D. Вранці застосувати олійну клізму
- E. **Дослідження проводиться натще***

120. Пацієнт скаржиться на біль у надлобковій ділянці, бажання випорожнити сечовий міхур, сечовиділення відсутнє упродовж 12 год. Який патологічний стан розвинувся у пацієнта?

- A. Ніктурія
- B. **Гостра затримка сечі***
- C. Олігурія
- D. Поліурія
- E. Ниркова колька

121. Як називається спеціалізований медичний заклад стаціонарного типу, де проводиться паліативне лікування пацієнтів із невиліковними хворобами?

- A. Клініка
- B. Санаторій
- C. **Хоспіс***
- D. Амбулаторія
- E. Поліклініка

122. Як називається процедура, що полягає у введенні розчинів лікарських засобів через порожнину матки в маткові труби для визначення їх прохідності або з лікувальною метою?

- A. Кольпоскопія
- B. Лапароскопія
- C. Гістероскопія
- D. **Гідротубація***
- E. Пертубація

123. Жінку в терміні вагітності 38-39 тижнів шпиталізовано до пологового будинку. Вкажіть ознаку початку пологової діяльності у жінки.

- A. Часте сечовипускання
- B. Біль у ділянці крижів
- C. Розкриття шийки матки
- D. **Регулярні перейми***
- E. Опущення дна матки

124. Пацієнту віком 38 років сімейним лікарем призначено внутрішньом'язові ін'єкції біциліну-5. Розчин якого препарату використовується для проведення внутрішньошкірної проби на індивідуальну чутливість до біциліну-5?

- A. **Бензилпеніциліну натрієвої солі***
- B. Цефазоліну
- C. Канаміцину

- D. Стрептоміцину сульфату
- E. Амоксициліну

125. Вкажіть причину ранньої післяпологової кровотечі, яку можна виявити, оглядаючи послід.

- A. Порушення зсідання крові
- B. Затримка частин плаценти***
- C. Щільне прикріплення плаценти
- D. Защемлення плаценти
- E. Порушення виділення плаценти

126. До жіночої консультації звернулася жінка у терміні вагітності 36 тижнів. Під час зовнішнього акушерського обстеження виявлено: обвід живота — 98 см, ВСДМ — 40 см, вислуховується серцебиття — 146/хв справа вище від пупка і 160/хв зліва нижче пупка. Визначте вид вагітності.

- A. Одноплідна
- B. Завмерла
- C. Багатоплідна***
- D. Несправжня
- E. Переношена

127. Яке додаткове обстеження треба провести пацієнту для виявлення конкрементів у нирках?

- A. Холецистографію
- B. Ректороманоскопію
- C. Іригоскопію
- D. Бронхоскопію
- E. УЗД***

128. Жінка віком 20 років скаржиться на загальну слабкість, підвищену втомлюваність, прискорене серцебиття, порушення смаку (бажання їсти крейду), блідість та сухість шкіри, ламкість нігтів, випадіння волосся. Для якого виду анемії характерні ці симптоми?

- A. Фолієводефіцитної
- B. Залізодефіцитної***
- C. Гіпопластичної
- D. B_{12} -дефіцитної
- E. Гемолітичної

129. Жінка скаржиться на гіркий присмак у роті, печію, нудоту і відрижку повітрям після вживання жирної та смаженої їжі. Для якого синдрому характерні ці клінічні прояви?

- A. Астеновегетативного синдрому
- B. Больового синдрому
- C. Кишкової диспепсії
- D. Шлункової диспепсії***
- E. Інтотоксикаційного синдрому

130. Пацієнту з діагнозом: неврастенія, гіперстенічна форма, призначено бром-електрофорез за методикою Вермеля. Як треба розташувати електроди у цьому разі?

- A. Один електрод на низ живота, другий — на попереково-крижову ділянку
- B. Один електрод на потилицю, другий — на попереково-крижову ділянку
- C. Один електрод між лопатками, другий — на литкові м'язи***

- D. Обидва електроди між правою та лівою лопатками
- E. Один електрод між лопатками, другий — на грудну клітку

131. З якою метою флакон із вушними краплями перед застосуванням треба підігріти у руках до температури тіла людини?

- A. Для підсилення лікувального ефекту
- B. Для попередження виникнення кашлю
- C. Для кращої взаємодії з назальними краплями
- D. Для попередження підвищення температури тіла
- E. Для уникнення запаморочення*

132. Пацієнтка після апендектомії скаржиться на дворазове блювання, затримку газів і відсутність випорожнень. Об'єктивно спостерігається: шкіра землистого кольору, язик сухий, обкладений білим нальотом, передня черевна стінка напружена. Яке ускладнення розвинулося у пацієнтки в ранньому післяопераційному періоді?

- A. Гострий перитоніт
- B. Гострий холецистит
- C. **Парез кишечника***
- D. Гострий аднексит
- E. Гострий панкреатит

133. Жінка віком 57 років скаржиться на біль у дрібних суглобах кистей рук, ранкову скутість, загальну слабкість. Об'єктивно спостерігається: температура тіла — 37,5°C, набряк і почервоніння п'ястково-фалангових і міжфалангових суглобів обох кистей та обмеження їхньої рухомості, кисті мають вигляд «ластів моржа». Який лабораторний показник найдоцільніше визначити в цьому разі?

- A. Білірубін
- B. АлАТ, АсАТ
- C. **Ревматоїдний фактор***
- D. С-реактивний білок
- E. Сечову кислоту

134. До сімейного лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на нудоту, зниження апетиту та тупий ниючий біль в епігастральній ділянці, який виникає за 15-30 хв після вживання їжі. Захворювання пов'язує з нерегулярним харчуванням. Об'єктивно спостерігається: шкіра та слизові оболонки блідо-рожеві, язик вкритий білим нальотом. Живіт під час пальпації м'який, болючий в епігастральній ділянці. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- A. Раку шлунку
- B. **Виразкової хвороби шлунку***
- C. Хронічного панкреатиту
- D. Хронічного гіпоацидного гастриту
- E. Виразкової хвороби дванадцятипалої кишки

135. Жінка отримала опік окропом передньої поверхні обох ніг, задньої поверхні тулуба та промежини. Визначте площу опікового ураження.

- A. 51%
- B. **37% ***
- C. 39%
- D. 19%
- E. 25%

136. Опіки якого ступеня характеризуються появою пухирів різної величини наповнених прозорою рідиною, на тлі гіперемованої шкіри?

- A. -
- B. I
- C. IV
- D. II***
- E. III

137. Яка шкала використовується для догоспітальної діагностики гострого порушення мозкового кровообігу?

- A. NIHSS
- B. MMSE
- C. FAST ***
- D. NRS
- E. ABCDE

138. У дівчини віком 19 років на шкірі грудної клітки, ший, бічних поверхонь тулуба, міжлопаткової ділянки та плечей виявлено численні незапальні плями жовтувато-коричневого та блідо-рожевого кольору. Позитивні «симптом стружки» (лущення плям у разі пошкрябування) та йодна проба Бальцера. Для якого захворювання характерні ці клінічні прояви?

- A. Мікроспорії
- B. Токсикодермії
- C. Дерматиту
- D. Екземи
- E. Висівкоподібного лишаю***

139. Жінка віком 28 років скаржиться на загальну слабкість і гострий біль у грудній клітці справа, що посилюється під час глибокого вдиху та нахилі тулуба в протилежний бік. Об'єктивно спостерігається: пацієнтка лежить на правому боці. Дихання часте, поверхнєве. Температура тіла — 37,4°C. Права половина грудної клітки відстає в акті дихання. Перкуторно над легеньми спостерігається чіткий легеневий звук. Аускультативно вислуховується шум терття плеври. Для якого захворювання характерні ці клінічні показники?

- A. Негоспітальної пневмонії
- B. Гострого бронхіту
- C. Сухого плевриту***
- D. Міжреберної невралгії
- E. Ексудативного плевриту

140. Пацієнтка після струмектомії скаржиться на млявість, загальну слабкість, зниження працездатності та пам'яті, мерзлякуватість, підвищену сонливість. Об'єктивно спостерігається: шкіра суха, лущиться, не береться в складку, волосся сухе, ламке, випадає. Пульс — 54/хв, ритмічний, АТ — 100/60 мм рт. ст. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- A. Акромегалії
- B. Атеросклерозу
- C. Цукрового діабету
- D. Гіпертиреозу
- E. Гіпотиреозу***

141. Під час лабораторного дослідження мокротиння виявлено спіралі Куршмана, кристали Шарко-Лейдена та еозинофіли. Для якого захворювання характерний такий результат дослідження?
- A. Сухого плевриту
 - B. Гострого бронхіту
 - C. Туберкульозу легень
 - D. Бронхоектатичної хвороби
 - E. **Бронхіальної астми***
142. Як називається спосіб комунікації, пов'язаний з використанням слів (мови) для передачі інформації?
- A. Офіційна
 - B. Невербальна
 - C. Виховна
 - D. Дистанційна
 - E. **Вербальна***
143. Яке ускладнення розвивається внаслідок потрапляння олійного розчину в просвіт судини під час виконання підшкірної ін'єкції?
- A. **Жирова емболія***
 - B. Гематома
 - C. Алергічна реакція
 - D. Абсцес
 - E. Інфільтрат
144. Які клінічні прояви найхарактерніші для системної склеродермії?
- A. **Маскоподібне обличчя, рот у вигляді «кисету» ***
 - B. Кільцеподібна еритема на руках і тулубі
 - C. Параорбітальний набряк із пігментацією
 - D. Деформації пальців рук у вигляді «плавників моржа»
 - E. Еритематозна висипка на обличчі у вигляді «метелика»
145. Який суб'єктивний симптом найхарактерніший для кропив'янки?
- A. Ціаноз шкіри
 - B. Сльозотеча
 - C. Іктеричність шкіри
 - D. **Свербіж шкіри***
 - E. Мерзлякуватість
146. Які процедури треба порадити пацієнту після зняття гіпсової пов'язки для відновлення функції травмованої нижньої кінцівки?
- A. УФО
 - B. **ЛФК, масаж***
 - C. Фототерапію
 - D. Гірудотерапію
 - E. Зігрівальний компрес
147. Щеплення новонароджених дітей від туберкульозу проводиться введенням вакцини БЦЖ внутрішньошкірно. Яке ускладнення розвивається у разі випадкового потрапляння вакцини під шкіру?
- A. **«Холодний абсцес» ***

- B. Олійна емболія
- C. Інфільтрат
- D. Виразка
- E. Ліподистрофія

148. Вода якої температури використовується для процедури постановки гірчичників?

- A. 25-27°C
- B. 20-25°C
- C. 18-20°C
- D. -
- E. 39-40°C***

149. Який засіб контрацепції використовується для запобігання незапланованої вагітності та інфікування захворюваннями, що передаються статевим шляхом?

- A. Хірургічна стерилізація
- B. Сперміциди
- C. Шийковий ковпачок
- D. Презерватив***
- E. Внутрішньоматкова спіраль

150. Які заходи (дії) треба включити сестрі медичній у план догляду за пацієнтом з геморагічним інсультом?

- A. Зняття ЕКГ
- B. Уведення анальгетиків
- C. Профілактику гіпостатичної пневмонії ***
- D. Уведення протиблювотних засобів
- E. Промивання шлунку