

**ДЕРЖАВНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР
ТЕСТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ З
ВИЩОЮ ОСВІТОЮ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ «МЕДИЦИНА» І
«ФАРМАЦІЯ» ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ»**

Варіант / Variant _

**ЗБІРНИК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ
СКЛАДАННЯ ЄДКІ ЗДОБУВАЧАМИ ФАХОВОЇ
ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ**

Спеціальність «МЕДСЕСТРИНСТВО»

2023-2024 р.н. (січень)

1. Пацієнту, який лікується в урологічному відділенні, призначено дослідження сечі за методом Зимницького. Яке співвідношення денного діурезу до нічного в нормі?

- A. 3:1*
- B. 1:4
- C. 1:3
- D. 1:1
- E. —

2. Який симптом найхарактерніший для хронічного гастриту з підвищеною секреторною функцією шлунку?

- A. Печія*
- B. Дисфагія
- C. Гикавка
- D. Діарея
- E. Метеоризм

3. У пацієнта, який хворіє на пневмонію, на тлі швидкого (упродовж декількох годин) зниження температури тіла із 39,5°C до 37,0°C, раптово виникли загальна слабкість, запаморочення, відчуття холоду, серцебиття. Об'єктивно спостерігається: пацієнт млявий, апатичний, із зусиллям відповідає на запитання. Шкірні покриви та слизові бліді, холодний липкий піт, кінцівки холодні, дихання поверхневе, пульс — 98 уд./хв, слабого наповнення, АТ — 80/50 мм рт. ст. Який патологічний стан розвинувся в пацієнта?

- A. Колапс*
- B. набряк легень
- C. Астматичний статус
- D. Анафілактичний шок
- E. Кардіогенний шок

4. Який лікарський засіб використовується для замісної терапії у разі недостатності зовнішньосекреторної функції підшлункової залози?

- A. Панкреатин*
- B. Папаверин
- C. Метоклопрамід
- D. Платифілін
- E. Активоване вугілля

5. Який шлях передачі інфекції в закладах охорони здоров'я відноситься до *артифіційних*?

- A. Асоційований із медичними процедурами*
- B. Контактно-побутовий
- C. Фекально-оральний
- D. Повітряно-краплинний
- E. Вертикальний

6. Під час об'єктивного обстеження пацієнта сестра медична виявила, що на тлі сповільненого та рівномірного за глибиною дихання з'являються тривалі паузи (до 30 сек). Який тип дихання спостерігається у пацієнта?

- A. Дихання Біота*
- B. Експіраторна задишка
- C. Дихання Чейна-Стокса
- D. Дихання Куссмауля
- E. Інспіраторна задишка

7. Яка анатомічна ділянка тіла людини використовується для проведення щеплення БЦЖ?

- A. Зовнішня поверхня верхньої третини лівого плеча*
- B. Середня третина внутрішньої поверхні передпліччя
- C. Підлопаткова ділянка
- D. Верхній зовнішній квадрант сідниці
- E. Передня поверхня стегна

8. Жінка віком 28 років скаржиться на загальну слабкість і гострий біль у грудній клітці справа, що посилюється під час глибокого вдиху та нахилі тулуба в протилежний бік. Об'єктивно спостерігається: пацієнтка лежить на правому боці, дихання часте, поверхнєве, температура тіла — 37,4°C, права половина грудної клітки відстає в акті дихання, перкуторно над легеньми визначається чіткий легеневий звук, аускультативно вислуховується шум тертя плеври. Для якого захворювання характерні ці клінічні прояви?

- A. Сухого плевриту*
- B. Міжреберної невралгії
- C. Ексудативного плевриту
- D. Гострого бронхіту
- E. Негоспітальної пневмонії

9. Працівники, які обслуговують каналізаційну мережу, відчули в повітрі специфічний запах «тухлих яєць». За одну годину після цього в них з'явилися слезотеча, різі в очах, кашель, нежить, задишка, біль у грудях, головний біль, запаморочення, нудота. Для отруєння якою хімічною речовиною характерні ці симптоми?

- A. Сірководнем *
- B. Фосгеном
- C. Аміаком
- D. Хлором
- E. Вуглецю оксидом

10. Чоловік віком 50 років скаржиться на загальну слабкість, свербіж шкіри, тупий ниючий біль у правому підребер'ї, здуття живота, закрепи, що чергуються з діареєю. Об'єктивно спостерігається: збільшення печінки, судинні зірочки на шкірі, розширення венозної сітки навколо пупка, асцит, гінекомастія. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- A. Цирозу печінки*
- B. Хронічного холециститу
- C. Вірусного гепатиту

- D. Жовчнокам'яної хвороби
- E. Хронічного гепатиту

11. У дівчини віком 19 років на шкірі грудної клітки, шиї, бічних поверхонь тулуба, міжлопаткової ділянки та плечей виявлено численні незапальні плями жовтувато-коричневого та блідо-рожевого кольору. Позитивні «симптом стружки» (лущення плям у разі пошкрябування) та йодна проба Бальцера. Для якого захворювання характерні ці клінічні прояви?

- A. Висівкоподібного лишаю*
- B. Мікроспорії
- C. Дерматиту
- D. Токсикодермії
- E. Екземи

12. Пацієнт віком 48 років скаржиться на слабкість та відчуття оніміння у нижніх кінцівках, біль у спині, порушення сечовиділення та затримку випорожнень. Скарги з'явилися після перенесеного грипу. Об'єктивно спостерігається: зниження поверхневої чутливості, гіпотонія та гіпотрофія м'язів нижніх кінцівок. Для якого захворювання характерні вказані клінічні прояви?

- A. Мієліту*
- B. Поліомієліту
- C. Розсіяного склерозу
- D. Пухлини спинного мозку
- E. Спінального інсульту

13. Що з нижченаведеного відноситься до медичних відходів категорії В?

- A. Використаний одноразовий шприц*
- B. Харчові відходи усіх відділень закладу охорони здоров'я
- C. Дезінфекційні засоби
- D. Первинна упаковка лікарських засобів
- E. Побутові відходи усіх відділень закладу охорони здоров'я

14. Як називається патологічний стан, що розвивається як ускладнення бронхіальної астми та характеризується повною резистентністю до бронхолітичних засобів?

- A. Астматичний статус*
- B. Легенева кровотеча
- C. Кардіогенний шок
- D. Набряк легень
- E. Анафілактичний шок

15. Чоловік скаржиться на раптову появу висипу на шкірі та свербіж після вживання полуниці. Під час огляду на шкірі тулуба та кінцівок виявлено червоні плями, пухирі різних розмірів, подряпини, АТ — 120/80 мм рт. ст, пульс — 82 уд./хв. Який патологічний стан розвинувся у чоловіка?

- A. Кропив'янка*
- B. Короста
- C. Геморагічний васкуліт

- D. Анафілактичний шок
- E. набряк Квінке

16. Під час лабораторного дослідження мокротиння виявлено спіралі Куршмана, кристали Шарко-Лейдена та еозинофіли. Для якого захворювання характерний цей результат дослідження?

- A. **Бронхіальної астми ***
- B. Гострого бронхіту
- C. Туберкульозу легень
- D. Бронхоектатичної хвороби
- E. Сухого плевриту

17. Як називається спосіб комунікації, пов'язаний із використанням слів (мови) для передачі інформації?

- A. **Вербальна***
- B. Виховна
- C. Невербальна
- D. Дистанційна
- E. Офіційна

18. У пацієнта, який хворіє на виразкову хворобу шлунку, раптово виникла шлунково-кишкова кровотеча. Які гемодинамічні зміни спостерігатимуться в пацієнта?

- A. **Тахікардія, зниження АТ ***
- B. Аритмія, АТ не змінюється
- C. Брадикардія, зниження АТ
- D. Тахікардія, підвищення АТ
- E. Брадикардія, підвищення АТ

19. У пацієнтки віком 49 років після приймання вітамінного препарату виникли набряк губ та язика, охриплість голосу, «гавкаючий» кашель, відчуття нестачі повітря, утруднене шумне дихання. Об'єктивно спостерігається: пацієнтка збуджена, намагається глибоко вдихнути, шкіра ціанотична. Який патологічний стан розвинувся у пацієнтки?

- A. **Набряк Квінке ***
- B. набряк легенів
- C. Анафілактичний шок
- D. Кропив'янка
- E. Поліноз

20. Як називається індивідуальна упаковка, що безпосередньо контактує з лікарським засобом та сприяє збереженню його основних властивостей?

- A. **Первинна***
- B. Зовнішня
- C. Спеціальна
- D. Вторинна
- E. Загальна

21. Яка шкала використовується для догоспітальної діагностики гострого порушення мозкового кровообігу?

- A. **FAST***
- B. ABCDE
- C. NIHSS
- D. MMSE
- E. NRS

22. Пацієнту призначено фізіотерапевтичну процедуру, під час якої (внаслідок змінення проникності судинної стінки) у шкірі виникають точкові мікрокрововиливи (петехії, плями), до складу яких входять біологічно активні речовини, що надають потужний стимулюючий ефект як на весь організм, так і на певну зону до повного їх розсмоктування. Яку процедуру призначено пацієнту?

- A. **Вакуум-терапію медичними банками***
- B. УВЧ-терапію
- C. Накладання гірчичників
- D. Накладання зігрівального компресу
- E. Застосування медичної грілки

23. Пацієнт хворіє на хронічний спастичний коліт. Який найпростіший фізіотерапевтичний засіб місцевого впливу застосовується для зменшення болю у животі під час кишкової коліки?

- A. **Медична грілка***
- B. Міхур із льодом
- C. Гірчичники
- D. Медичні п'явки
- E. Медичні банки

24. Пацієнту неврологічного відділення з припущенням на субарахноїдальний крововилив проведено спинномозкову пункцію. Який колір ліквору характерний для цього виду порушення мозкового кровообігу?

- A. **Червоний***
- B. Прозорий
- C. Каламутний
- D. Безбарвний
- E. Жовтувато-зеленуватий

25. Чоловік, який хворіє на гіпертонічну хворобу, після емоційного перенавантаження раптово втратив свідомість. Об'єктивно спостерігається: зіниці на світло не реагують, гіперемія обличчя, пульс — 110 уд./хв, напружений, АТ — 200/110 мм рт. ст., лівий кут рота опущений, лівостороння геміплегія. Яке положення тіла треба надати пацієнту під час надання невідкладної допомоги?

- A. **На спині, з піднятим головним кінцем ліжка***
- B. На правому боці, з відхиленою назад головою
- C. На животі, з повернутою набік головою
- D. На спині, з піднятим ножним кінцем ліжка
- E. На лівому боці, з відхиленою назад головою

26. У чоловіка віком 28 років у ділянці верхньої губи спостерігаються гіперемія шкіри та поява дрібних пухирців із гнійним умістом, покритих жовтими кірками, піднижньощелепний лімфаденіт. Для якої патології характерні ці симптоми?

- A. Сикозу*
- B. Кандидозу
- C. Мікроспорії
- D. Фурункулу
- E. Імпетиго

27. Який збудник найчастіше спричиняє розвиток післяпологового маститу?

- A. Золотистий стафілокок*
- B. Протей
- C. Стрептокок
- D. Анаеробні коки
- E. Епідермальний стафілокок

28. Пацієнт скаржиться на біль у надлобковій ділянці, бажання випорожнити сечовий міхур, сечовиділення відсутнє упродовж 12 годин. Для якого патологічного стану характерні вказані клінічні прояви?

- A. Гострої затримки сечі *
- B. Гідроцеле
- C. Ниркової коліки
- D. Розриву сечового міхура
- E. Травми нирки

29. У пацієнта діагностовано цукровий діабет 2-го типу легкого ступеня тяжкості (рівень глікемії — 8 ммоль/л, глюкозурія — до 20 г/добу). Вкажіть ключовий захід для підтримки стану компенсації вуглеводного обміну в пацієнта в цьому разі.

- A. Дієтотерапія*
- B. Вітамінотерапія
- C. Повноцінний сон
- D. Загартовування
- E. Прогулянки

30. У чотирирічної дитини на шкірі тулуба виявлено висипання у вигляді поодиноких розеол, папул із ледь помітними пухирцями. Загальний стан дитини задовільний, температура тіла — 36,6°C. З анамнезу відомо, що дитина була в контакті з хворим на вітряну віспу, після чого їй було проведено пасивну специфічну профілактику. Яка форма вітряної віспи у дитини?

- A. Рудиментарна*
- B. Типова
- C. Бульозна
- D. Пустульозна
- E. Вісцеральна

31. Який розмір периферичного венозного катетера переважно використовується для внутрішньовенних інфузій у новонароджених дітей?

- A. 26G*
- B. 18G
- C. 14G
- D. 20G
- E. 16G

32. Який із нижченаведених методів дослідження є найінформативнішим у діагностиці бронхоекстатичної хвороби?

- A. Бронхографія*
- B. Ларингоскопія
- C. Велоергометрія
- D. Спірометрія
- E. Бронхіальна артеріографія

33. У пацієнта розвинувся анафілактичний шок. Який лікарський препарат використовується насамперед під час надання невідкладної допомоги пацієнту?

- A. Епінефрин*
- B. Атропін
- C. Ампіцилін
- D. Еритроміцин
- E. Диклофенак

34. Епідемічний паротит — це інфекційне захворювання, що характеризується гарячкою, інтоксикацією та запаленням слинних залоз. Вкажіть збудника цього захворювання.

- A. *Mups virus з родини Coronaviridae**
- B. *Poliovirus з родини Picornaviridae*
- C. *Rubeola virus, роду Morbilivirus*
- D. *Bordetella pertussis*
- E. *Togaviridae, роду Rubivirus*

35. Щеплення новонароджених дітей від туберкульозу проводиться введенням вакцини БЦЖ внутрішньошкірно. Яке ускладнення розвивається у разі випадкового потрапляння вакцини під шкіру?

- A. «Холодний абсцес» *
- B. Медикаментозна емболія
- C. Виразка
- D. Ліподистрофія
- E. Інфільтрат

36. Пацієнту віком 58 років діагностовано цироз печінки. Раптово у нього з'явилися такі симптоми: збудження змінилося на сонливість, нудота, блювання, посмикування м'язів обличчя та кінцівок, з рота відчувається запах аміаку, температура тіла — 40,0°C, дихання Чейна-Стокса. Яке ускладнення розвинулося у пацієнта?

- A. Печінкова кома*

- В. Пенетрація
- С. Перфорація
- Д. Бактеріальний перитоніт
- Е. Шлункова кровотеча

37. У тримісячної дитини спостерігається неспокій, плаксивість, порушення сну, підвищена пітливість, облісіння потилиці, здуття живота. Для якого захворювання характерні ці клінічні прояви?

- А. Рахіту***
- В. Спазмофії
- С. Алергічного діатезу
- Д. Гіпотрофії
- Е. Гіпервітамінозу D

38. Вкажіть ключову умову для попередження пневмотораксу під час дренування плевральної порожнини.

- А. Забезпечення герметичності системи***
- В. Дотримання правил асептики
- С. Проведення загальної анестезії
- Д. Проведення місцевої анестезії
- Е. Перебування пацієнта під час процедури у позі «вершника»

39. У чоловіка виявлено відкритий перелом середньої третини лівого стегна. Із рани пульсуючим струменем витікає кров яскраво-червоного кольору. Який тимчасовий метод спинення кровотечі потрібно застосувати в цьому разі?

- А. Накладання артеріального джгута***
- В. Тиснуха пов'язка
- С. Підвищене положення кінцівки
- Д. Туга тампонада рани
- Е. Максимальне згинання кінцівки в суглобі

40. У гастроентерологічному відділенні лікується пацієнт із діагнозом: виразкова хвороба шлунку. Які лікарські засоби пригнічують секрецію шлункового соку?

- А. Інгібітори протонної помпи***
- В. Антигістамінні
- С. Антибактеріальні
- Д. Антацидні
- Е. Нестероїдні протизапальні

41. У породіллі за тиждень після пологів підвищилася температура тіла до 39,0°C, з'явилися біль унизу живота, озноб, нудота, головний біль. Під час гінекологічного дослідження виявлено гнійні виділення з цервікального каналу, потовщення, набряки та біль у ділянці придатків матки. Яке післяпологове захворювання розвинулося в жінки?

- А. Сальпінгоофорит***
- В. Параметрит

- C. Ендометрит
- D. Пельвіоперитоніт
- E. Перитоніт

42. У пацієнтки діагностовано системний червоний вовчак. Вкажіть ключовий метод профілактики загострень цієї хвороби.

- A. **Фотопротекція (обмеження перебування на сонці) ***
- B. Вживання у їжу йодовмісних продуктів (риба, йодована сіль)
- C. Обмеження фізичної активності
- D. Загартовування (водні процедури)
- E. Запобігання стресу

43. У пологовій залі породіллі запропонували провести перше раннє прикладання дитини до грудей. Це покращить скорочення матки та відшарування й народження посліду. Стимуляція синтезу якого гормону відбувається в цьому разі?

- A. **Окситоцину***
- B. Соматотропіну
- C. Хоріонічного гонадотропіну
- D. Вазопресину
- E. Адренкортикотропного

44. Як називається патологічний стан, що характеризується болем у суглобі та не супроводжується запальним процесом та/або порушенням рухливості в ньому?

- A. **Артралгія***
- B. Артрит
- C. Полікістоз
- D. Поліартрит
- E. Артроз

45. Вкажіть прилад, який дозволяє виміряти пікову швидкість форсованого видиху та використовується для діагностики та оцінки ефективності лікування хронічних обструктивних захворювань легень (бронхіальної астми, хронічного обструктивного бронхіту тощо).

- A. **Пікфлоуметр***
- B. Глюкометр
- C. Пульсоксиметр
- D. Тонometr
- E. Радіометр

46. Пацієнту проведено прицільну біопсію з метою діагностики онкологічного захворювання. Яке лабораторне дослідження біоптату треба використати для виявлення злоякісних клітин чи інших змін, що можуть вказувати на наявність пухлинного процесу?

- A. **Цитологічне***
- B. Серологічне
- C. Загальноклінічне
- D. Біохімічне
- E. Бактеріологічне

47. Пацієнту діагностовано хронічну серцеву недостатність. Об'єктивно спостерігається: збільшення маси тіла та зменшення виділення кількості сечі. Аналіз водного балансу встановив, що добовий діурез пацієнта становить 50% від кількості прийнятої рідини. На що вказують результати обстеження?

- A. **Появу прихованих набряків***
- B. Зневоднення
- C. Порушення метаболізму
- D. Ексикоз
- E. Ожиріння

48. Які лікарські засоби відносяться до списку «Б»?

- A. **Сильнодіючі***
- B. Психотропні
- C. Наркотичні
- D. Отруйні
- E. Імунобіологічні

49. Які продукти треба обмежити в раціоні пацієнта, у якого виявлено здуття живота та метеоризм?

- A. **Капусту, бобові***
- B. Яйця, гречану крупу
- C. М'ясо, печінку
- D. Яблука, гарбуз
- E. Каву, міцний чай

50. Яке специфічне ускладнення інсулінотерапії може розвинути, якщо не змінювати місце введення інсуліну?

- A. **Ліподистрофія***
- B. Некроз
- C. Інфільтрат
- D. Абсцес
- E. Гематома

51. Вкажіть місце перебування породіллі упродовж найближчих двох годин після фізіологічних пологів.

- A. **У пологовій залі***
- B. У гінекологічному відділенні
- C. У відділенні патології вагітних
- D. У післяпологовому відділенні
- E. У відділенні екстрагенітальної патології

52. У п'ятирічної дитини, яка відвідує дитячий дошкільний заклад, спостерігається підвищення температури тіла, біль у горлі. Під час огляду виявлено блідість носогубного трикутника, «малиновий язик» та дрібнопапульозний висип на гіперемованій шкірі, що максимально локалізується на згинальних поверхнях кінцівок, у складках. Вкажіть термін ізоляції хворої дитини.

- A. **22 дні***
- B. 21 день
- C. 5 днів від початку захворювання
- D. 5 днів від моменту появи висипань
- E. 7 днів

53. Жінку в терміні вагітності 38-39 тижнів шпиталізовано до пологового будинку. Вкажіть ознаку початку пологової діяльності у жінки.

- A. **Регулярні перейми***
- B. Біль у ділянці крижів
- C. Розкриття шийки матки
- D. Опущення дна матки
- E. Часте сечовипускання

54. У пацієтки перебіг цукрового діабету ускладнився розвитком синдрому діабетичної стопи. Які поради по догляду за нижніми кінцівками необхідно надати пацієнтці?

- A. **Не ходити босоніж***
- B. Користуватися пемзою
- C. Використовувати тальк
- D. Приймати гарячі ванни для ніг
- E. Носити відкрите взуття

55. Пацієнту, який хворіє на залізодефіцитну анемію, призначено терапію препаратами заліза. Одночасне приймання якого вітаміну покращує всмоктування та засвоєння заліза?

- A. **Аскорбінової кислоти***
- B. Токоферолу
- C. Кальциферолу
- D. Піридоксину
- E. Ціанокобаламіну

56. Вкажіть місце накладання електроду із зеленим маркуванням під час проведення електрокардіографії.

- A. **Ліва нога***
- B. Ліва рука
- C. Права нога
- D. —
- E. Права рука

57. У пацієнта розвинувся ангіоневротичний набряк. Препарати якої фармакологічної групи потрібно застосовувати для надання невідкладної допомоги в цьому разі?

- A. **Антигістамінні***
- B. Адреноміметики
- C. Анальгетики
- D. Антибіотики
- E. Антихолінестеразні

58. Який симптом (за автором) є часто позитивним у разі захворювань нирок?
- A. **Пастернацького***
 - B. Бабінського
 - C. Щоткіна-Блюмберга
 - D. Ортнера
 - E. Кера
59. Вкажіть прояви дизуричного синдрому.
- A. **Часте болісне сечовипускання**
 - B. Гіпертензія, набряки
 - C. Позитивний симптом Пастернацького
 - D. Альбумінурія, кетонурія
 - E. Піурія, протеїнурія
60. Який вид анестезії використовується під час оперативного лікування підшкірного панарицію?
- A. **За Оберстом- Лукашевичем***
 - B. Внутрішньокісткова
 - C. Інфільтраційна
 - D. За Вишневським
 - E. Термінальна
61. Із якою метою флакон із вушними краплями перед застосуванням треба підігріти у руках до температури тіла людини?
- A. **Для уникнення запаморочення ***
 - B. Для попередження виникнення кашлю
 - C. Для підсилення лікувального ефекту
 - D. Для кращої взаємодії з назальними краплями
 - E. Для попередження підвищення температури тіла
62. Пацієнт, який збирає сечу для дослідження за методом Зимницького, повідомив сестру медичну про те, що не може зібрати сечу в третій контейнер, у зв'язку з відсутністю позиву до сечовипускання. Яка тактика сестри медичної в цьому разі?
- A. **Залишити третій контейнер порожнім***
 - B. Виконати катетеризацію сечового міхура
 - C. Дати пацієнту випити води
 - D. Застосувати методи рефлекторного впливу на акт сечовипускання
 - E. Увести пацієнту сечогінний препарат
63. У пацієнта з хронічною нирковою недостатністю швидкість клубочкової фільтрації становить 14 мл/хв. До якої лікувальної процедури необхідно підготувати пацієнта в цьому разі?
- A. **Гемодіалізу***
 - B. Фонофорезу
 - C. Літотрипсії
 - D. Шунтування
 - E. Лапароцентезу

64. Який із нижченаведених чинників сприяє розвитку хронічного бронхіту?

- A. **Активне і пасивне куріння***
- B. Надлишкова маса тіла
- C. Зловживання алкоголем
- D. Недотримання режиму харчування
- E. Малорухливий спосіб життя

65. Пацієнтка скаржиться на зміну гостроти зору, двоїння в очах, погіршення сну, пітливість, дратівливість, зменшення маси тіла за збереженого апетиту. Об'єктивно спостерігається: тремор рук і тіла, пульс — 110 уд./хв, екзофтальм, збільшення розмірів щитоподібної залози. Попередній діагноз: дифузний токсичний зоб. Який із нижченаведених факторів посідає перше місце серед можливих причин розвитку цього захворювання?

- A. **Психотравма***
- B. Переохолодження
- C. Порушення дієти
- D. Куріння
- E. Шкідливі звички

66. Як називається порушення діурезу, що характеризується зменшенням добової кількості сечі?

- A. **Олігурія***
- B. Дизурія
- C. Полакіурія
- D. Ніктурія
- E. Поліурія

67. Пацієнту з гострим коронарним синдромом призначено нітрогліцерин сублінгвально у дозі 0,5 мг. Який показник систолічного артеріального тиску в пацієнта є протипоказанням для його застосування?

- A. **<90 мм рт. ст.***
- B. <180 мм рт. ст.
- C. <150 мм рт. ст.
- D. <140 мм рт. ст.
- E. <120 мм рт. ст.

68. Чоловік після тряскої їзди скаржиться на сильний нападopodobний біль у поперековій ділянці та часті позиви до сечовипускання, нудоту, блювання. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, пацієнт збуджений, намагається обрати положення тіла для полегшення болю. Які заходи долікарської допомоги доцільно застосувати в цьому разі?

- A. **Покласти грілку на поперекову ділянку***
- B. Увести сечогінні препарати
- C. Увести седативні препарати
- D. Провести катетеризацію сечового міхура
- E. Покласти міхур із льодом на поперекову ділянку

69. Вкажіть тривалість приймання родонової ванни.

- A. **10-15 хв***
- B. 5 - 7 хв
- C. 50-60 хв
- D. 1 - 2 хв
- E. 30-40 хв

70. Який лікарський засіб, що пригнічує агрегацію тромбоцитів, застосовується на догоспітальному етапі під час надання невідкладної допомоги пацієнту з інфарктом міокарда?

- A. **Ацетилсаліцилова кислота***
- B. Нітрогліцерин
- C. Гепарин
- D. Ніфедипін
- E. Бісопрол

71. У чоловіка віком 50 років раптово виник різкий, інтенсивний, стискальний, пекучий біль за грудниною з іррадіацією в ліву руку та ліву лопатку. Біль триває упродовж 2-х годин, не знімається нітрогліцерином. Об'єктивно спостерігається: пацієнт збуджений, відчуває страх смерті, шкіра та видимі слизові оболонки бліді, ціаноз губ, пульс — 84 уд./хв, ритмічний, АТ — 130/80 мм рт. ст., тони серця ослаблені. На ЕКГ спостерігається патологічний зубець Q у відведеннях I, aVL і V1-V2. Для якого клінічного варіанта інфаркту міокарда це характерно?

- A. **Ангінозного***
- B. Церебрального
- C. Гастралгічного
- D. Астматичного
- E. Аритмічного

72. Для профілактики якого ускладнення під час підшкірної ін'єкції олійного розчину потрібно відтягнути поршень шприца назад після проколу шкіри перед введенням препарату?

- A. **Медикаментозної емболії***
- B. Некрозу
- C. Повітряної емболії
- D. Інфільтрату
- E. Гематоми

73. Жінка отримала опік окропом передньої поверхні обох ніг, задньої поверхні тулуба та промежини. Визначте площу опікового ураження.

- A. **37%***
- B. 19%
- C. 39%
- D. 25%
- E. 51%

74. Жінка віком 57 років скаржиться на біль у дрібних суглобах кистей рук, ранкову скутість, загальну слабкість. Об'єктивно спостерігається: температура тіла — 37,5°C, набряк і почервоніння п'ястково-фалангових і міжфалангових суглобів обох кистей та обмеження їхньої рухомості, кисті мають вигляд «ластів моржа». Визначення рівня якого лабораторного показника є найінформативнішим для встановлення діагнозу?

- A. Ревматоїдного фактора*
- B. С-реактивного білка
- C. АлАТ, АсАТ
- D. Білірубіну та його фракцій
- E. Сечової кислоти

75. У тяжкохворого лежачого пацієнта на шкірі п'яток та ліктів виявлено зону стійкої гіперемії, цілісність шкіри не порушена. Вкажіть стадію розвитку пролежня.

- A. I*
- B. III
- C. —
- D. II
- E. IV

76. Який найпростіший фізіотерапевтичний засіб місцевого впливу застосовується у II періоді гарячки?

- A. Міхур із льодом*
- B. Медичну грілку
- C. Медичні банки
- D. Гірчичники
- E. Зігрівальний компрес

77. Пацієнтка віком 60 років скаржиться на загальну слабкість, задишку, серцебиття, пощипування язика, зниження апетиту, утруднення при ходінні, відчуття оніміння в кінцівках. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда з лимонним відтінком, язик гладкий, глянцекий, з атрофією сосочків. Живіт під час пальпації м'який, не болючий, печінка виступає з-під краю реберної дуги на 1,5 см. У загальному аналізі крові: еритроцити — $1,2 \cdot 10^{12}/\text{л}$, гемоглобін — 58 г/л, КП — 1,4, виявлено тільки Жоллі та кільця Кебота, макроцитоз. Для якого виду анемії характерні вказані клініко-лабораторні показники?

- A. Вітамін B₁₂-дефіцитної*
- B. Апластичної
- C. Аутоімунної гемолітичної
- D. Залізодефіцитної
- E. Гострої постгеморагічної

78. Пацієнта віком 25 років шпиталізовано бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги до лікарні у непритомному стані. З анамнезу відомо, що пацієнт хворіє на цукровий діабет 1-го типу та вводить інсулін. Об'єктивно спостерігається: блідість і вологість шкірних покривів, підвищення м'язового тону, судоми, розширення зіниць, тонус очних яблук не змінений. Рівень глюкози у крові — 2,2 ммоль/л. Який вид коми розвинувся в пацієнта?

- A. **Гіпоглікемічна***
- B. Діабетична
- C. Мозкова
- D. Уремична
- E. Гіперосмолярна

79. Який метод контролю якості дезінфекції передбачає посів матеріалу на поживне середовище для виявлення мікрофлори?

- A. **Бактеріологічний***
- B. Інструментальний
- C. Хімічний
- D. Фізичний
- E. Візуальний

80. Чоловік скаржиться на періодичні закрепи, випорожнення з домішками крові та переймоподібний біль у животі. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, живіт бере участь в акті дихання, м'який. У лівому підребер'ї пальпується щільне болюче утворення. Який інструментальний діагностичний метод використовується для обстеження всіх відділів товстого кишечника та взяття біопсії?

- A. **Колоноскопія***
- B. Іригоскопія
- C. Оглядова рентгенографія ОЧП
- D. Ультразвукове дослідження
- E. Комп'ютерна томографія

81. Пацієнту встановлено діагноз: інсулінозалежний цукровий діабет. Яка тактика зменшить ризик розвитку атрофії підшкірної жирової клітковини під час інсулінотерапії?

- A. **Зміна місця ін'єкцій***
- B. Уведення підігрітого розчину інсуліну
- C. Використання інсулінових шприців
- D. Повільне (упродовж 15-20 хв) введення інсуліну
- E. Уведення інсуліну за 15-20 хв до приймання їжі

82. У семирічної дитини після внутрішньовенного введення антибіотика з'явилися слабкість, пульсуючий головний біль, відчуття стиснення в грудях та нестачі повітря, надсадний кашель. Об'єктивно спостерігається: різка блідість шкірних покривів, експіраторна задишка, дистанційні хрипи. Для якого варіанта перебігу анафілактичного шоку характерні зазначені симптоми?

- A. **Асфіктичного ***
- B. Церебрального
- C. Абдомінального
- D. Гемодинамічного
- E. Змішаного

83. Як називається метод неінвазивного дослідження функції зовнішнього дихання, що проводиться для оцінки стану легень та бронхів, діагностики захворювань дихальної системи та контролю їх лікування?

- A. **Спірографія***
- B. Бронхоскопія
- C. УЗД легенів
- D. Оглядова рентгенографія органів грудної клітки
- E. Шкірні алергологічні тести

84. Тяжкохворий пацієнт хоспісу перебуває на ліжковому режимі. З якою метою застосовується шкала Braden під час догляду за пацієнтом?

- A. **Оцінювання ступеня виникнення ризику пролежнів***
- B. Корекції психоемоційного стану
- C. Оцінки психоемоційного стану
- D. Розрахунку індексу маси тіла
- E. Планування реабілітаційних заходів

85. Вкажіть віддалене ускладнення генітального туберкульозу в жінок.

- A. **Безпліддя***
- B. Порушення менструального циклу
- C. Субфебрилітет
- D. Швидка втомлюваність
- E. Підвищена пітливість

86. Споживання продуктів зі збагаченим вмістом якого мікроелемента треба порекомендувати пацієнту, який хворіє на хронічну серцеву недостатність?

- A. **Калію***
- B. Натрію
- C. Заліза
- D. Кальцію
- E. Магнію

87. Для якого захворювання характерним є зниження секреторної та кислотоутворювальної функцій шлунку?

- A. **Хронічного атрофічного гастриту***
- B. Хронічного панкреатиту
- C. Цирозу печінки
- D. Хронічного гіпертрофічного гастриту
- E. Виразкової хвороби шлунку

88. Жінка віком 20 років скаржиться на загальну слабкість, підвищену втомлюваність, прискорене серцебиття, порушення смаку (бажання їсти крейду), блідість та сухість шкіри, ламкість нігтів, випадіння волосся. Для якого виду анемії характерні ці симптоми?

- A. **Залізодефіцитної***
- B. Гіпопластичної
- C. Вітамін B₁₂-дефіцитної

- D. Фолієводефіцитної
- E. Гемолітичної

89. Для профілактики якого специфічного ускладнення черевного тифу на 3-му тижні хвороби пацієнту треба дотримуватися ліжкового режиму?

- A. Кишкової кровотечі*
- B. Розриву селезінки
- C. Рецидиву захворювання
- D. Печінкової недостатності
- E. Генералізації інфекції

90. Пацієнт, який проживає в гірській місцевості, скаржиться на відчуття стиснення в ділянці шиї, розлади ковтання, сухий кашель, утруднене дихання. Об'єктивно спостерігається: рівномірне дифузне збільшення щитоподібної залози без локальних ущільнень. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- A. Ендемічного зоба*
- B. Підгострого тиреоїдиту
- C. Гіпотиреозу
- D. Дифузного токсичного зоба
- E. Аутоімунного тиреоїдиту

91. Який суб'єктивний симптом найхарактерніший для кропив'янки?

- A. Свербіж шкіри*
- B. Сльозотеча
- C. Мерзлякуватість
- D. Ціаноз шкіри
- E. Іктеричність шкіри

92. У пацієнта затяжний напад бронхіальної астми завершився розвитком астматичного статусу. Який показник є ключовим для призначення оксигенотерапії?

- A. Рівень сатурації*
- B. Частота дихальних рухів
- C. Вік пацієнта понад 50 років
- D. Тривалість хвороби
- E. Температура тіл

93. Пацієнт віком 52 роки скаржиться на нападоподібний біль у правому підребер'ї з іррадіацією в праве плече та праву ключицю, гіркоту в роті, нудоту. Виникнення цих симптомів пов'язує із вживанням смаженої їжі. Об'єктивно спостерігається: пацієнт неспокійний, язик обкладений жовтим нальотом, пульс — 88 уд./хв, ритмічний, АТ — 120/80 мм рт. ст. Живіт під час пальпації м'який, болючий у правому підребер'ї, позитивні симптоми Ортнера, Кера. Препарати якої групи потрібно застосувати насамперед для надання невідкладної допомоги?

- A. Спазмолітики*
- B. Ентеросорбенти
- C. Стимулятори перистальтики
- D. Проносні
- E. Протимікробні

94. Як називається графічне відображення результатів динамічного спостереження під час пологів за процесом розкриття шийки матки та просування голівки плода, пологовою діяльністю, станом матері та плода?

- A. **Партограма***
- B. Міограма
- C. Спірограма
- D. Кардіограма
- E. Токограма

95. У пацієнта на тлі перебігу гострого інфаркту міокарда раптово погіршився загальний стан, посилюється біль у серці, виникла різка слабкість. Об'єктивно спостерігається: свідомість сплутана, акроціаноз, холодний липкий піт, АТ — 70/30 мм рт. ст., пульс — 110 уд./хв, слабкого наповнення. Яке ускладнення розвинулося в пацієнта?

- A. **Кардіогенний шок***
- B. Тромбоемболія легеневої артерії
- C. Серцева астма
- D. набряк легень
- E. Нестабільна стенокардія

96. Дієтотерапія — це метод лікування за допомогою раціонального харчування. Що означає принцип заміщення в дієтотерапії?

- A. **Уведення в раціон харчування продуктів, у компонентах яких організм має дефіцит***
- B. Виключення з раціону харчування їжі, багатої на клітковину
- C. Уникання можливості вживання продуктів, забруднених мікробами
- D. Збалансування харчування щодо білків, жирів, вуглеводів
- E. Вживання продуктів харчування з тривалим терміном придатності

97. Вкажіть дію, спричинену електричним струмом, що проходить через організм людини, яка виявляється у подразненні збудливих тканин організму людини.

- A. **Біологічну***
- B. Електролітичну
- C. Магнітну
- D. Термічну
- E. —

98. В якому періоді менструального циклу найчастіше виникає апоплексія яєчника?

- A. **У період овуляції***
- B. У період регресу жовтого тіла
- C. У фолікуліновій фазі
- D. У лютеїновій фазі
- E. У період менструації

99. У пульмонологічному відділенні лікується пацієнт із діагнозом: бронхоектатична хвороба. Яку процедуру необхідно застосувати для покращення відходження слизу та мокротиння з дихальних шляхів?

- A. **Постуральний дренаж***
- B. Зігрівальні компреси
- C. Кріотерапія
- D. Парафінові аплікації
- E. Фонофорез

100. У пацієнта, який хворіє на виразкову хворобу шлунку, з'явилися скарги на швидку втомлюваність, втрату апетиту, відразу до м'ясної їжі, посилене слиновиділення, порушення ковтання. Для якого ускладнення характерні ці симптоми?

- A. **Малігнізація***
- B. Пілоростенозу
- C. Шлункової кровотечі
- D. Пенетрації
- E. Перфорації

101. П'ятирічна дитина захворіла гостро, спостерігається підвищення температури тіла до 39°C, сильний головний біль, повторне блювання. Під час об'єктивного обстеження виявлено: різка гіперестезія до всіх видів подразників, ригідність потиличних м'язів, позитивні симптоми Керніга та Брудзинського. Результати лабораторного дослідження спинномозкової рідини: ліквор каламутний, білого кольору, нейтрофільний плеоцитоз, збільшення кількості білка. У загальному аналізі крові: лейкоцитоз із нейтрофіліозом та зсувом лейкоцитарної формули вліво, лімфопенія, підвищення ШОЕ до 40 мм/год. Який збудник, найімовірніше, спричинив розвиток захворювання?

- A. **Менінгокок ***
- B. Стафілокок
- C. Мікобактерія туберкульозу
- D. Стрептокок
- E. Ротавірус

102. У породіллі після народження посліду посилилася кровотеча. Об'єктивно спостерігається: матка м'яка, погано скорочується, під час огляду плаценти виявлено дефект часточки посліду. Яка акушерська маніпуляція застосовується в цьому разі?

- A. **Ручна ревізія порожнини матки***
- B. Введення токолітичних препаратів
- C. Зовнішній масаж матки
- D. Масаж матки на кулаці
- E. Огляд пологових шляхів

103. Пацієнт віком 37 років скаржиться на кашель із виділенням великої кількості мокротиння з неприємним запахом, інколи «повним ротом», задишку, періодичне підвищення температури тіла та зниження працездатності. Об'єктивно спостерігається: мокротиння гнійно-слизового характеру, розшароване. Для якого захворювання характерні вказані клінічні прояви?

- A. **Бронхоектатичної хвороби***
- B. Негоспітальної пневмонії
- C. Гострого бронхіту
- D. Ексудативного плевриту
- E. Сухого плевриту

104. Яке захворювання нирок характеризується наявністю таких клінічних проявів: артеріальна гіпертензія, олігурія та набряки?

- A. Гостра ниркова недостатність
- B. Сечокам'яна хвороба
- C. Хронічний пієлонефрит
- D. Гострий гломерулонефрит ***
- E. Хронічна ниркова недостатність

105. Який розчин використовується для промивання постійного катетера Фолея?

- A. 0,02%-й розчин фурациліну***
- B. 3%-й розчин хлораміну
- C. 5%-й розчин глюкози
- D. 2%-й розчин натрію гідрокарбонату
- E. 6%-й розчин перекису водню

106. Реабілітаційна програма для збереження функції уражених суглобів у пацієнтів із ревматоїдним артритом зазвичай включає різні методи лікування. Вкажіть метод, який спрямований на поліпшення рухливості та функції суглобів.

- A. Механотерапія ***
- B. Вісцеральна терапія
- C. Пневмопресинг
- D. Міостимуляція
- E. Вакуумний масаж

107. Яке положення тіла потрібно надати шестирічній дитині, у якої після введення антибіотика розвинувся анафілактичний шок?

- A. На спині, з повернутою на бік головою***
- B. На лівому боці
- C. Напівсидяче
- D. На спині, з припіднятими ногами
- E. На животі

108. У жінки в терміні вагітності 35 тижнів з'явилися різкий біль у животі та незначні кров'яністі виділення зі статевих шляхів. Об'єктивно спостерігається: блідість шкіри, пульс — 100 уд./хв, АТ — 100/60 мм рт. ст., матка напружена, болюча, положення плода поздовжнє, голівка передлежить над площиною входу в малий таз, ЧСС плода — 160 уд./хв, ритмічне. Який патологічний стан розвинувся у жінки?

- A. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти***
- B. Неповне передлежання плаценти
- C. Аборт у ході
- D. Загроза розриву матки
- E. Розрив матки, що відбувся

109. У чоловіка з діагнозом: недостатність мітрального клапана, після фізичного навантаження раптово з'явилися задишка, клекотливе дихання, виділення рожевого пінистого мокротиння. Який патологічний стан розвинувся у чоловіка?

- A. **Набряк легень***
- B. Легенева кровотеча
- C. Серцева астма
- D. Гіпертонічний криз
- E. Астматичний статус

110. Який біологічний матеріал використовується для первинного діагностичного тесту на виявлення легеневого туберкульозу та визначення стійкості до рифампіцину у разі неможливості забору мокротиння?

- A. **Кал ***
- B. Ексудат
- C. Сеча
- D. Слина
- E. Кров

111. У пацієнта, який хворіє на виразкову хворобу шлунку, раптово розпочалося блювання «кавовою гущею». Які заходи невідкладної допомоги треба провести насамперед на догоспітальному етапі?

- A. **Прикласти міхур із льодом на ділянку епігастрія***
- B. Застосувати ентеросорбенти
- C. Промити шлунок
- D. Застосувати протиблювотні препарати
- E. Прикласти медичну грілку на ділянку епігастрія

112. Вкажіть біологічно активну речовину, що міститься у секреті слинних залоз п'явки.

- A. **Гірудин***
- B. Лізоцим
- C. Гепарин
- D. Гістамін
- E. Фібринолізин

113. Яке додаткове обстеження треба провести пацієнту для виявлення конкрементів у нирках?

- A. **УЗД***
- B. Іригоскопію
- C. Бронхоскопію
- D. Холецистографію
- E. Ректороманоскопію

114. Як називається розмір площини входу в малий таз, що проходить між крижовим мисом та серединою верхньо- внутрішнього краю лобкового симфізу?

- A. **Прямий***
- B. Поперечний
- C. Косий
- D. —
- E. Інтерспінальний

115. У пацієнта після парентерального введення антибіотика розвинувся анафілактичний шок. Яка ділянка тіла використовується для первинного внутрішньом'язового введення епінефрину під час надання невідкладної допомоги?

- A. Зовнішня поверхня стегна *
- B. Зовнішня поверхня передпліччя
- C. Внутрішня поверхня стегна
- D. Внутрішня поверхня передпліччя
- E. Внутрішня поверхня плеча

116. Вкажіть типовий симптом, характерний для хронічної серцевої недостатності.

- A. Набряки на нижніх кінцівках*
- B. Крововиливи на шкірі
- C. Підвищення температури тіла
- D. Набряки на обличчі
- E. Пітливість

117. Як називається процедура, що полягає у введенні розчинів лікарських засобів через порожнину матки в маткові труби для визначення їх прохідності або з лікувальною метою?

- A. Гідротубація*
- B. Лапароскопія
- C. Гістероскопія
- D. Пертубація
- E. Кольпоскопія

118. У пацієнтки віком 60 років після фізичного навантаження виник стискаючий біль за грудниною з іррадіацією в ліву руку та ліве плече. Біль тривав близько 5-ти хвилин та минув після сублінгвального застосування нітрогліцерину. Об'єктивно спостерігається: блідість шкіри, пульс — 78 уд./хв, АТ — 130/80 мм рт. ст. Для якої патології характерні вказані клінічні прояви?

- A. Стенокардії*
- B. Інфаркту міокарда
- C. Міжреберної невралгії
- D. Гострого перикардиту
- E. Міокардиту

119. Як називається метод ендоскопічного дослідження внутрішньої поверхні сечового міхура?

- A. Цистоскопія*
- B. Колоноскопія
- C. Езофагогастродуоденоскопія
- D. Бронхоскопія
- E. Ректороманоскопія

120. У вагітної жінки віком 42 роки під час вимірювання зовнішніх розмірів таза з'ясувалося, що зовнішня кон'югата становить 15 см. Яка тактика ведення пологів у цьому разі?

- A. **Кесарів розтин***
- B. Вакуум-екстракція плода
- C. Стимуляція пологів
- D. Накладання акушерських щипців
- E. Витягання плода за тазовий кінець

121. Який метод дослідження сечі використовується для визначення концентраційної функції нирок?

- A. **За Зимницьким ***
- B. За Амбурже
- C. За Аддіс-Каковським
- D. За Нечипоренком
- E. —

122. У пацієнтки віком 55 років після емоційного перенавантаження з'явилися скарги на головний біль у потиличній ділянці, запаморочення, «миготіння мушок» перед очима, шум і дзвін у вухах, блювання. Об'єктивно спостерігається: пульс — 98 уд./хв, ритмічний, АТ— 190/100 мм рт. ст. Який патологічний стан розвинувся у пацієнтки?

- A. **Гіпертонічний криз***
- B. Кардіогенний шок
- C. Анафілактичний шок
- D. Тирсотоксичіший криз
- E. Колапс

123. Яке дослідження проводиться для виявлення прихованої коронарної недостатності та ранньої діагностики стенокардії?

- A. **Велоергометрія***
- B. Енцефалографія
- C. Нейроміографія
- D. Спірографія
- E. Аудіометрія

124. Нормальні пологи — це одноплідні пологи з мимовільним початком і прогресуванням пологової діяльності у потиличному передлежанні плода, що перебігають без ускладнень протягом усіх періодів пологів, за задовільного стану породіллі та новонародженого. У якому терміні вагітності відбуваються нормальні пологи?

- A. **37-42 тиж.***
- B. 27-32 тиж.
- C. 32-35 тиж.
- D. 35-37 тиж.
- E. 42-45 тиж.

125. У пацієнта терапевтичного відділення діагностовано виразкову хворобу дванадцятипалої кишки. Яка бактерія спричиняє це захворювання?

- A. ***Helicobacter pylori****
- B. *Streptococcus*
- C. *Staphylococcus aureus*
- D. *Escherichia coli*
- E. *Salmonella*

126. Для якого захворювання характерні такі клінічні прояви: гострий початок, слабо виражені катаральні явища, дрібний блідо-рожевий плямисто-папульозний висип, без тенденції до злиття, з переважною локалізацією на спині, сідницях та розгинальних поверхнях верхніх кінцівок, системне збільшення лімфатичних вузлів?

- A. **Краснухи***
- B. Скарлатини
- C. Кору
- D. Вітряної віспи
- E. Менінгококової інфекції

127. Які процедури треба порадити пацієнту після зняття гіпсової пов'язки для відновлення функції травмованої нижньої кінцівки?

- A. **ЛФК, масаж ***
- B. Фототерапію
- C. Зігрівальний компрес
- D. УФО
- E. Гірудотерапію

128. Опіки якого ступеня характеризуються появою пухирів різної величини, наповнених прозорою рідиною, на тлі гіперемованої шкіри?

- A. **II***
- B. —
- C. I
- D. III
- E. IV

129. Пацієнтка скаржиться на ранкову скутість, деформацію і постійний біль у дрібних суглобах, зниження фізичної активності. Об'єктивно спостерігається: симетричні згинальні контрактури дрібних суглобів. На рентгенограмі кисті й зап'ястка - ерозії та виражений остеопороз безпосередньо прилеглих до суглоба кісток, анкілоз. Для якого захворювання це характерно?

- A. **Ревматоїдного артриту***
- B. Деформуючого остеоартрозу
- C. Системного васкуліту
- D. Ревматичного поліартрити
- E. Системного червоного вовчака

130. До якої фармакологічної групи відноситься діазепам?

- A. **Транквілізатори***
- B. Ноотропи
- C. Антидепресанти
- D. Антikonвульсанти
- E. Міорелаксанти

131. У пацієнтки віком 25 років за 2 тижні після перенесеного тонзиліту з'явилися різкий біль і припухлість колінних суглобів, згодом — гомілково-ступневих, підвищення температури до 38,0°C, серцебиття, задишка та рожеві еритематозні висипання на тулубі. Біль у суглобах має мігруючий характер, без стійкого порушення функції. У крові: лейкоцитоз, підвищення ШОЕ, С- реактивний білок — ++++. Для якого захворювання характерні вказані клініко- лабораторні показники?

- A. **Гострої ревматичної гарячки***
- B. Реактивного артрити
- C. Хвороби Рейтера
- D. Ревматоїдного артрити
- E. Подагри

132. Вкажіть метод специфічної профілактики туберкульозу, що проводиться особам, які перебувають у контакті з пацієнтом, хворим на активну форму туберкульозу.

- A. **Хіміопрофілактика ізоніазидом***
- B. —
- C. Щеплення вакциною БЦЖ
- D. Хіміопрофілактика стрептоміцином
- E. Ревакцинація вакциною БЦЖ

133. Пацієнт скаржиться на втрату апетиту, гіркий присмак у роті, біль і відчуття тяжкості у правому підребер'ї, жовтяничність шкіри і склер, свербіж шкіри, біль у суглобах. За результатами біохімічного дослідження крові виявлено високий рівень прямого білірубіну, виражена активність аланінамінотрансферази. Для якого захворювання характерні вказані клініко-лабораторні показники?

- A. **Хронічного гепатиту***
- B. Хвороби Крона
- C. Виразкової хвороби шлунку
- D. Гострого гастриту
- E. Хронічного панкреатиту

134. Пацієнт із діагнозом: хронічний панкреатит, отримує протирецидивне лікування. Яке дослідження доцільно провести для визначення зовнішньосекреторної функції підшлункової залози?

- A. **Дослідження калу на вміст еластази-1 ***
- B. УЗД органів черевної порожнини
- C. Загальний аналіз крові
- D. Дослідження шлункового соку
- E. Холецистографію

135. У роділлі триває перший період фізіологічних пологів, латентна фаза. Термін вагітності — 39 тижнів, вагітність II, пологи II. Як часто потрібно вислуховувати серцебиття для оцінки стану плода?

- A. **Кожні 30 хв***
- B. 3 інтервалом 20 хв
- C. 3 інтервалом 10 хв
- D. Раз на 1 год
- E. Кожні 15 хв

136. Пацієнту призначено внутрішньом'язове введення 60 мг 4%-го розчину гентаміцину сульфату. В ампулах по 2 мл міститься 80 мг цього антибіотика. Який об'єм препарату треба набрати у шприц для виконання ін'єкції?

- A. **1,5 мл***
- B. 2 мл
- C. 3 мл
- D. 1 мл
- E. 0,5 мл

137. Пацієнт ендокринологічного відділення скаржиться на прискорене серцебиття, біль у ділянці серця, погіршення сну, схуднення на тлі підвищення апетиту. Об'єктивно спостерігається: пацієнт збуджений, тремор пальців рук, шкіра волога, тепла, температура тіла — 37,2°C, пульс — 100 уд./хв, АТ — 150/90 мм рт. ст., екзофтальм, позитивний симптом Грефе, збільшення щитоподібної залози, тони серця звучні, систолічний шум на верхівці. Яке дослідження треба провести для визначення функції щитоподібної залози?

- A. **Аналіз крові на тиреоїдні гормони***
- B. УЗД щитоподібної залози
- C. Аналіз крові на глюкозу
- D. Загальний аналіз крові
- E. МРТ головного мозку

138. Вкажіть засіб, яким потрібно промити непошкоджену шкіру при потраплянні на неї крові або інших потенційно небезпечних біологічних рідин.

- A. **Водою з милом***
- B. Антисептиком
- C. Фізіологічним розчином
- D. Дезінфікуючим розчином
- E. Етиловим спиртом

139. Яка група лікарських препаратів використовується для етіотропного лікування госпітальної (нозокаміальної) пневмонії, спричиненої аеробними грамнегативними паличками?

- A. **Антибіотики***
- B. Бронхолітики
- C. Відхаркувальні
- D. Седативні
- E. Жарознижувальні

140. У пацієнтки віком 67 років раптово розвинулися загальна слабкість, запаморочення, оніміння лівої верхньої кінцівки, погіршення мови та зору. Симптоми зберігаються понад 24 год. В анамнезі: ішемічна хвороба серця, перенесений інфаркт міокарда. Для якого порушення мозкового кровообігу характерні вказані клінічні прояви?

- A. **Ішемічного інсульту***
- B. —
- C. Дисциркуляторної енцефалопатії
- D. Геморагічного інсульту
- E. Транзиторної ішемічної атаки

141. Пацієнту встановлено діагноз: гострий пієлонефрит. Чим зумовлений біль у поперековій ділянці у разі цього захворювання?

- A. **Розтягненням ниркової капсули ***
- B. Корінцевим синдромом
- C. Дизуричними розладами
- D. Уремією
- E. Підвищенням артеріального тиску

142. Для якого захворювання характерні такі особливості аналізу сечі: сеча каламутна, з осадом і пластівцями, лейкоцитурія, бактеріурія, протеїнурія (менше 1 г/л)?

- A. **Гострого пієлонефриту***
- B. Хронічного гломерулонефриту
- C. Гострої ниркової недостатності
- D. Гострого гломерулонефриту
- E. Сечокам'яної хвороби

143. Як називається спеціалізований медичний заклад стаціонарного типу, де проводиться паліативне лікування пацієнтів із невиліковними хворобами?

- A. **Хоспіс***
- B. Амбулаторія
- C. Санаторій
- D. Клініка
- E. Поліклініка

144. Який із нижченаведених чинників сприяє розвитку виразкової хвороби?

- A. **Стрес***
- B. Алергени
- C. Переохолодження
- D. Молодий вік
- E. Ожиріння

145. Які клінічні прояви найхарактерніші для гострого пієлонефриту?

- A. **Гарячка, біль у поперековій ділянці ***
- B. Гіпертензія, набряки
- C. Тахікардія, сеча кольору «м'ясних помийів»
- D. Анурія, свербіж шкіри
- E. —

146. У якій лабораторії проводиться дослідження носоглоткових змивів на грип та ГРВІ?

- A. Вірусологічний *
- B. Клінічний
- C. Бактеріологічний
- D. Біохімічний
- E. Імунологічний

147. У пацієнта віком 42 роки встановлено діагноз: сечокам'яна хвороба. Які продукти харчування рекомендується вживати пацієнту в разі фосфатурії?

- D. М'ясні страви*
- B. Лужні мінеральні води
- C. Прянощі
- D. Гострі страви
- E. Незбиране молоко

148. Вкажіть постін'єкційне ускладнення, що характеризується гнійним запаленням м'яких тканин та утворенням порожнини, заповненої гноєм.

- A. Абсцес*
- B. Емболія
- C. Інфільтрат
- D. Некроз
- E. Флебіт

149. Яке додаткове обстеження потрібно провести пацієнту з припущенням на ішемічний інсульт?

- A. Магнітно-резонансну томографію*
- B. Електроміографію
- C. Рентгенографію кісток черепа
- D. Ехокардіографію
- E. Електрокардіографію

150. Яке співвідношення розчинника та активної речовини антибіотика використовується у разі стандартного розведення антибіотика?

- A. 1 мл на 100 000 ОД*
- B. 5 мл на 100 000 ОД
- C. 1 мл на 500 000 ОД
- D. 2 мл на 200 000 ОД
- E. 2 мл на 100 000 ОД